

مشاكل جلدية: InfoVIHtal 39

الأسباب الأساسية للمشاكل الجلدية عند الأشخاص الحاملين لVIH تتمثل في 3 أسباب: التفاعلات بين جهاز المناعة وVIH ، الإصابة بعدي أمراض أخرى والمفعولات الثانوية للأدوية. بعض حالات الجلد التي تتعلق بVIH أو بالمفعولات الثانوية للعلاج يمكن أن تكون خطيرة جداً وتحتاج عناية طبية مستعجلة.

جهاز المناعة وVIH

عند ما يصاب الشخص للمرة الأولى بVIH ، يمكن أن تظهر أعراض مثل أعراض الزكام. هذه الحالة من العدوى تسمى سيروكونفريسيون seroconversión و يمكن أن تسبب طفح محرمة بدون حكة لمدة 2 إلى 3 أسابيع. خلال الإصابة بالعدوى، يحصل خلل في جهاز المناعة و يمكن أن ينبع عن هذا تهيج محرر للجلد. هذا التهيج أو الرغبة الملحة للحك يتم علاجها بالدهون إستيرويدس و أنتيإستمينك antihistaminicas esteroides. مشاكل الجلد (خاصة حب الشباب و إنفاخ الجريب) يمكن أن تظهر أيضاً عندما يبدأ جهاز المناعة في استرجاع قوته بمفعول الأدوية المضادة لVIH ، مما يظهر أنه عالمة إيجابية لإعادة هيكلة قدرة جهاز المناعة.

مشاكل الجلد الناتجة عن العدوى

عامة، تنقسم الإصابات بالعدوى إلى 3 مجموعات كبرى حسب نوع الجسيمات التي تسببها: بكتيريا، فطريات أو فيروسات. ظهور الأكزيما (تهيج أو جفاف الجلد) لديها عدة أسباب و يمكن أن تعالج بantihistaminicos للتخفيف من حالات جفاف الجلد، من المستحسن تجنب الحمامات الطويلة و إستعمال الصابون و مواد أخرى يمكن أن تسبب التهيج، و الزيادة من إستعمال الدهان ذات قاعدة مائية أو مرطبة. التهاب الجلد (إنفاخ الجلد) يعرف بظهور لطخات محرمة في الجلد و طفح قشرية. يمكن أن يكون سببها فطريات أو أكزيما. إنفاخ الغدد ذات سيلان دهنی ما يسمى ب dermatitis seborreica يظهر خاصة في جهات الجسم التي يتموضع فيها الشعر ولها مظهر قشرة صفراء، هذه الإصابة المنتشرة بين الأشخاص ذوي أعراض VIH تعالج بأدنهة إستيرويدس esteroides ، أدنهة ضد الفطريات أو الأقراص. بعض المشاكل على مستوى فروة الرأس يتم حلها عن طريق شامبو ضد الفطريات أو ضد القشرة.

داء السعفة la tiña هي عدوى سببها الفطريات التي تسبب تشر محرم للجلد و لطخات بيضاء مبللة. تعالج بدهان ضد الفطريات antifungicas وأيضاً يمكن أن يكون فعالاً إستعمال الزيت المنحل لشجر الشاي. من المستحسن الإحتفاظ بجلد جافة و تجنب مواد مهيجة للجسم، مثل العطور. فوليكلوينيس la folliculitis (كتل صغيرة أو بثور في الجريبات، حدور الشعر) هي عدوى على مستوى الجلد، غالباً سببها الخميرة، و التي تعالج بمضادات الفطريات. الحصف el impétigo هي إصابة بعدي بكتيريا على مستوى الجلد تتمثل في ظهور قروح محرمة ذات قشرة صفراء. جدور شعر الجسم يمكن أن تصاب بالعدوى و ينبع دمامل تعالج بمضادات حيوية.

بعض الإصابات الفيروسية، مثل المسببة من طرف الفيروس pox، مثل الرخوي المعدي و أحد الإصابات بالفطريات مثل كريبيتوكوكوسيس criptococcosis، يمكن أن يسبب في ظهور حبيبات صغيرة لونها لؤلؤي. الرخوي ينتشر بسرعة كبيرة و يحتاج لعلاج مناسب في مركز مختص بVIH . البثور، خاصة التناسلية و الشرجية التي سببها الفيروس بابيلوما بشري papiloma humano (VPH) ، تلاحظ بتكرار عند الأشخاص الحاملين لVIH (انظر 40 # : البثور التناسلية).

المضاعفات الثانوية للأدوية

الأشخاص الحاملين لVIH الذين يتناولون مضادات الفيروس يمكن أن تظهر عليهم مضاعفات ثانوية متعلقة بالجلد، مثل التطفح. أغلب هذه الأعراض معتدلة و لا تمنع إستمرار العلاج. للتخفيف من إحتمال ظهور هذه المضاعفات، يمكن تناول بعض الأدوية بجرعة قليلة، مثل nevirapina ، و الزيادة في الجرعات بعد أسبوعين. التقليل من الجرعة يمكن أن يكون فعالاً، رغم أنه من المستحسن، القيام بذلك باستشارة طبيب مختص بVIH.

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

إذا ما كان الطفح معتدلا، يمكن بداية تناول الأدوية في تاريخ لاحق. لكن، إذا ما كان خطيرا، يجب ترك الدواء.

Nevirapina يمكن أن يسبب طفح عند 20-30% من الأشخاص الحاملين لVIH اللذين يتناولونه، و efavirenz عند 5% تقريبا. هذا الطفح عادة ما يكون معتدلا و يختفي عندما يعتاد الجسم على الدواء.

الطفح هو علامة لرد فعل الحساسية لدواء مضاد لVIH abacavir. إذا ما حدث هذا المفعول، من الأفضل الإتصال بعجلة بالطبيب..إذا ما تم الإنقطاع عن abacavir لأنه تم ظهور الطفح الحساسي، ينصح عدم إعادة تناوله، لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات ثانوية قاتلة.

أدوية أخرى تستعمل بانتظام لعلاج الإصابات عند الأشخاص الحاملين لVIH يمكن أن تسبب أيضا طفوح و مفعولات على مستوى الجلد. من بين هذه الأدوية نجد: pirimetamina ، dapsona ، cotrimoxazol ، sulfadiazina و tiacetazona ، aminopenicilina ، atovacuona ، clindamicina