




O VIH pode transmitir-se durante as seguintes actividades:




Sexo vaginal sem preservativo.



Sexo anal sem preservativo.



Sexo oral (felação) sem preservativo.
(A transmissão produz-se com menos frequência do que durante o sexo vaginal ou anal).



Uso de drogas injectáveis, se se partilha o material de injeção.




Durante a gravidez ou o nascimento, se não se tomarem medidas.




Lactação.

Não existe risco de transmissão do VIH por:



Dar um aperto de mão




Beijar ou abraçar



Partilhar talheres ou copos




Usar as casas de banho



Respirar o mesmo ar



Cuspir, espirrar ou tossir



Picadelas de mosquitos

A destacar

- O VIH só se pode transmitir quando determinados fluídos corporais de uma pessoa entram noutra pessoa.
- Apenas os seguintes fluídos corporais contêm quantidade suficiente de VIH para que se produza transmissão: o sémen, o fluido das mucosas da vagina e do ânus, o sangue e o leite materno.
- A transmissão sexual do VIH pode prevenir-se usando preservativos de forma correcta.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (Espania)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Programa de Prevenció i Assistència de la Sida



Àrea d'Acció Social y Ciutadania



Àrea de Benestar Social

Colaboran:

