

إذا كان داء السل يجعلك مريضاً، و أيضاً، كنت حامل لـ VIH، على العموم يجب عليك تناول أدوية ضد كلا الإصابتين.




3 بعض الأشخاص يبدأون بالعلاج المضاد للسل و بعد مرور بعض الأسابيع أو الأشهر يبدأون بعلاج VIH.

1 إتباع العلاج المضاد للسل، يمكنك التخلص من البكتيريا التي تسبب السل (TB).

مضادات TB

- و بعبارة أخرى، يمكنك الشفاء من مرض السل.
- بشكل عام من الضروري نحو ستة أشهر، و لكن يمكن أن تحتاج لوقت أطول.



4 و لكن، أشخاص آخرين يجب عليهم بداية العلاجين في وقت واحد.

- هذا حسب الضرورة الملحة التي قد تتطلب للعلاج بمضادات VIH.

2 إتباع العلاج المضاد لـ VIH، تقلل من إمكانية الإصابة بمرض السل مرة أخرى في المستقبل.

مضادات VIH

- العلاج المضاد للفيروس يساعد على منع VIH من إلحاق الضرر بجهاز المناعة.
- نظام المناعة القوي يحمي الجسم من الإصابات، بما فيها السل.



من الجدير بالذكر

- الأدوية المضادة للسل يمكن أن تقتل البكتيريا التي تسبب مرض السل.
- الأدوية المضادة للفيروس يمكن أن تجعل جهاز مناعتك أقوى، و هذا سوف يساعد على تجنب إصابتك مرة أخرى بالسل في المستقبل.

ملحوظة

سواء في حالة التداوي بمضادات للسل أو مضادات للفيروس، فمن المهم أن تتناول كل الجرعات على النحو المنصوص عليه. بعد عدة أسابيع من التداوي، قد تشعر بالتحسن، لكن السل و VIH يظلان في جسمك. إذا توقفت عن تناول الأدوية، يمكنك الإصابة بالمرض مرة أخرى. و مع ذلك، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض، قد تسبب هذه الأدوية آثار جانبية، و خاصة عندما يتم تناولها معا.

تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف الأصلي NAM، منظمة غير ربحية لـ VIH، ومقرها في المملكة المتحدة. المنشور الأصلي هو متاح في www.aidsmap.com. و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من NAM.

nam

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR