


Se a tuberculose o(a) está a pôr doente e se, além disso, estiver infectado(a) com o VIH, terá, em princípio, de fazer o tratamento contra as duas infecções.


1 Com o tratamento anti-tuberculose pode livrar-se da bactéria que provoca a tuberculose (TB).

Anti-TB

- Por outras palavras, pode curar-se da tuberculose.
- O tratamento dura em geral 6 meses, mas pode ser necessário mais tempo.




3 Algumas pessoas começam primeiro o tratamento anti-tuberculoso, iniciando depois, poucas semanas ou meses mais tarde, o tratamento contra o VIH.



2 Com o tratamento anti-VIH, reduz a possibilidade de se voltar a infectar com tuberculose de novo no futuro.


Anti-VIH

- O tratamento anti-retroviral ajuda a evitar que o VIH danifique o sistema imunitário.
- Um sistema imunitário forte protege o organismo contra as infecções, incluindo a tuberculose.



4 No entanto, algumas pessoas têm de iniciar os dois tratamentos ao mesmo tempo.

- Isso dependerá da urgência com que você precise do tratamento anti-VIH.



A destacar

- Os fármacos anti-tuberculosos podem acabar com a bactéria que produz a tuberculose.
- Os fármacos anti-retrovirais podem tornar o seu sistema imunitário mais forte. Isto irá ajudá-lo(a) a evitar que se infecte de novo com tuberculose no futuro.

Nota

Tanto no caso do tratamento anti-tuberculose como no do tratamento anti-retroviral, **é muito importante tomar todas as doses tal como foram prescritas**. Após algumas semanas de tratamento, é possível que se sinta melhor, mas a tuberculose e o VIH continuarão presentes no seu organismo, pelo que, se deixar de fazer os tratamentos, poderá ficar doente outra vez. Por outro lado, é preciso ter em atenção que estes fármacos também **podem provocar efeitos secundários**, especialmente quando se tomam juntos.



Este material é baseado numa publicação com copyright original da NAM, organização sem fins lucrativos na área do VIH/SIDA, com sede no Reino Unido. A publicação original está disponível em www.aidsmap.com. A tradução deste material foi realizada com a autorização da NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



Colaboran:

