

Если туберкулез делает вас больным, и кроме того, у вас ВИЧ, как правило вам нужно будет принимать лечение против обеих инфекций.


- 1** С помощью противотуберкулезного лечения, вы можете освободиться от бактерии, которая производит туберкулез (ТВ).

### Анти-ТВ

- Другими словами, вы можете вылечиться от туберкулеза.
- Как правило, на лечение вам потребуется около шести месяцев, но лечение может и занять больше времени.



- 3** Некоторые люди начинают сначала антитуберкулезное лечение, а лечение против ВИЧ позже, через несколько недель или месяцев.



- 2** С помощью лечения анти-ВИЧ, вы уменьшаете возможность повторного заражения туберкулезом в будущем.


### Анти-ВИЧ

- Антиретровирусное лечение помогает предотвратить поражение иммунной системы ВИЧ.
- Сильная иммунная система может защитить организм от инфекций, включая туберкулез.



- 4** Без сомнения, некоторые люди должны начать лечение одновременно.

- Это зависит от срочности, с которым необходимо начать лечение анти-ВИЧ.



## Важно

- Противотуберкулезные препараты могут покончить с бактерией, которую производит туберкулез.
- Антиретровирусные препараты могут сделать вашу иммунную систему более сильной. Это вам поможет избежать повторного заражения туберкулезом в будущем.

## На заметку

Как и в случае противотуберкулезного, так и антитуберкулезного лечения, **очень важно принимать все дозы, как они предписаны врачом.** Через несколько недель лечения, возможно вы почувствуете себя лучше, но туберкулез и ВИЧ останутся в вашем организме. Если прекратите принимать лечение, то можете заболеть снова. Однако, кроме предотвращения заболеваний, эти препараты могут **вызвать побочные эффекты**, особенно когда вы принимаете их вместе.

**nam** Этот материал основан на публикации при признании авторских прав NAM, организации ВИЧ, ОНП с главным офисом в Великобритании. Оригинал публикации можете найти на сайте [www.aidsmap.com](http://www.aidsmap.com). Перевод этого материала разрешен NAM.