



INFECCÃO PRIMÁRIA PELO VIH



Designa-se por infecção primária (também chamada infecção aguda ou primoinfecção) o período correspondente aos primeiros 6 meses depois do momento em que o VIH entra no organismo.

01 O QUE ACONTECE DURANTE A INFECCÃO PRIMÁRIA?




Inicialmente, o VIH começa por se reproduzir sem controlo, chegando a alcançar níveis de carga viral (quantidade de vírus no sangue) muito elevados. Com o tempo, o organismo inicia a resposta à infecção e fabrica anticorpos, o que reduz a carga viral.

02 SINTOMAS DA INFECCÃO PRIMÁRIA

Depois do momento em que o vírus entra no organismo, estes sintomas demoram vários dias ou semanas até aparecerem, e podem prolongar-se até duas semanas. Contudo, muitas pessoas não notam nada durante esse período. Em geral, trata-se de sintomas pouco específicos que se poderiam confundir com uma gripe ou outras infecções comuns. Os sintomas mais frequentes são a febre, inflamação dos gânglios, erupção cutânea, feridas na boca e/ou garganta e dores musculares ou articulares.

PRINCIPAIS SINTOMAS DA INFECCÃO AGUDA PELO VIH



03 TRATAMENTO DURANTE A INFECCÃO PRIMÁRIA

Muitos estudos mostram que o início do tratamento logo durante esta fase pode ter efeitos benéficos para a saúde a médio e longo prazo. Note-se, contudo, que para muitas pessoas, pode ser difícil tomar decisões sobre o início do tratamento tão pouco tempo depois de saberem que estão infectadas.



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN A



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA
DE LA SIDA



FOR SOLIDARIEDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org