


ENFERMEDADES INTESTINALES PARASITARIAS Y VIH



01


LOS PARÁSITOS Y SUS SÍNTOMAS

La infección por VIH puede aumentar el riesgo de padecer algunas enfermedades parasitarias. La mayoría causan síntomas intestinales tales como la diarrea.

Una diarrea prolongada en el tiempo que no se acaba de curar y que no responde al tratamiento podría estar causada por parásitos intestinales. Para saberlo, habrá que realizar un análisis de una muestra de heces.

Algunos de los parásitos intestinales más frecuentes son:

- Isospora belli
- Cryptosporidium
- Giardia
- Entamoeba
- Blastocystis



02

TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN

Los parásitos intestinales se suelen adquirir por consumir agua y alimentos contaminados con materia fecal o por contacto sexual boca-año.

La prevención se basa en una correcta higiene de los alimentos, el consumo de agua potable y el uso de métodos barrera en las relaciones sexuales donde haya contacto boca-año.

03

A DESTACAR:

- En general, todas estas enfermedades cuentan con tratamientos efectivos, aunque las recaídas pueden ser frecuentes.
- Podrían ser más frecuentes, más graves y más difíciles de tratar si los recuentos de células de CD4 son bajos.

GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FOR SOLIDARITAT / OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona / ÀREA DE BENÉSTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org