

MALADIES INTESTINALES PARASITAIRES ET VIH-






LES PARASITES ET LEURS SYMPTÔMES

L'infection par le VIH peut augmenter le risque d'être atteint de certaines maladies parasitaires. La plupart provoquent des symptômes intestinaux tels que la diarrhée.

Une diarrhée prolongée qui ne guérit pas et qui ne répond pas au traitement peut être causée par des parasites intestinaux. Pour le savoir il faut réaliser l'analyse d'un échantillon de selles.

Certains des parasites les plus fréquents sont:

- Isospora belli
- Cryptosporidium
- Giardia
- Entamoeba
- Blastocystis



TRANSMISSION ET PRÉVENTION

Les parasites intestinaux s'acquièrent généralement par la consommation d'eau et d'aliments contaminés par de la matière fécale ou par contact sexuel bouche-anus

La prévention repose sur une correcte hygiène des aliments, la consommation d'eau potable et l'utilisation de méthodes barrières lors des rapports sexuels avec contact bouche-anus.

À SOULIGNER:

- En général, toutes ces maladies disposent de traitements efficaces, même si les rechutes peuvent être fréquentes.
- Elles pourraient être plus fréquentes, plus graves et plus difficiles à traiter si les comptages de cellules de CD4 étaient faibles.

