

يتمثل في استعمال الأدوية ضد VIH للحد من احتمال اكتساب الفيروس بعد ممارسة محفوفة بالمخاطر أو التعرض إلى حادثة (على سبيل المثال في العمل)

InfoVIHtal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH

117


ÁRABE

العلاج الوقائي بعد التعرض

الوقت هو عامل مهم جدا. لتحقيق أقصى فائدة، يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، أفضل وقت هو خلال 4 ساعات الأولى بعد ممارسة محفوفة بالمخاطر. الفعالية تتناقص تدريجيا وابتداء من 72 ساعة لا تعتبر فعالة.



للحصول عليها يجب الذهاب إلى قسم الطوارئ في المستشفى.



يجب على قسم الطوارئ في المستشفى تقديم المساعدة لك وتوفير العلاج، إذا لزم الأمر، مجانا رغم عدم توفرك على البطاقة الصحية.

الفريق الطبي سوف يقوم بتقييم خطر انتقال العدوى لكي يحدد ما إذا ما كان هناك حاجة للعلاج الوقائي بعد التعرض

العلاج يستمر لمدة 28 يوما، ويتكون من ثلاثة أدوية التي يمكن تقسيمها إلى حبتين أو ثلاث حبوب مختلفة.

العلاج الوقائي بعد التعرض، هو مثل أي علاج بالأدوية، يمكن أن يسبب بعض المضاعفات الجانبية مثل صداع في الرأس، الشعور بالضيق، احمرار الجلد أو الإسهال. عادة ما تكون خفيفة وعابرة. إذا كان أي من هذه المضاعفات شديدة أو طالت لفترة طويلة، استشر مع طبيبك الذي وصفها لك لينصحك بكيفية التعامل معها.



GTT-VIH

GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENIONA



FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia

Ajuntament de Barcelona

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS

Diputació
Barcelona

ÀREA DE BENEFAR SOCIAL

COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41

consultas@gtt-vih.org

