

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN



Consiste en el uso de fármacos frente al VIH para reducir la probabilidad de adquirir el virus tras una práctica de riesgo o una exposición accidental (por ejemplo en el trabajo).

01

El tiempo es un factor muy importante. Para obtener el máximo beneficio, debe iniciarse lo antes posible, idealmente en las 4 primeras horas tras la práctica de riesgo. Su eficacia disminuye de forma progresiva y a partir de las 72 horas no se considera efectiva.



02

Para solicitarla es necesario acudir al Servicio de Urgencias de un centro hospitalario.

03

El Servicio de Urgencias del centro hospitalario debe atenderte y proporcionarte el tratamiento, en caso necesario, de forma gratuita aunque no dispongas de la tarjeta sanitaria.

04

El equipo médico que te atienda evaluará el riesgo de transmisión para determinar si en tu caso es necesaria la profilaxis postexposición.

05

El tratamiento tiene una duración de 28 días y está formado por tres medicamentos que pueden estar repartidos en dos o tres píldoras diferentes.

06

La profilaxis postexposición, como cualquier tratamiento con medicamentos, puede producir algunos efectos secundarios tales como dolor de cabeza, malestar, enrojecimiento de la piel o diarrea. Suelen ser leves y pasajeros. Si alguno de estos efectos secundarios es intenso o prolongado, consulta al médico que te lo ha prescrito cómo manejarlos.



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



FOR SOLIDARITAT
ALTRES FINES D'INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia



ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENEFICÈNCIA SOCIAL

COLABORA



ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE
IMMIGRACIÓ I SALUT



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org