

Consiste no uso de fármacos anti-VIH após uma prática de risco ou uma exposição acidental (por exemplo, no trabalho), com o objectivo de reduzir a probabilidade de adquirir o VIH

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO



01

O tempo é um factor muito importante. Para se obter o máximo benefício, deve iniciar-se a profilaxia logo que possível, idealmente nas primeiras 4 horas após a prática de risco. A sua eficácia diminui de forma progressiva e a partir das 72 horas não se considera eficaz.



02

Para fazer esta profilaxia, é necessário recorrer ao Serviço de Urgências de um hospital.

03

El equipo médico que te atienda evaluará el riesgo de transmisión para determinar si en tu caso es necesaria la profilaxis postexposición.

04

A equipa médica que o atender avaliará o risco de transmissão a que esteve submetido, para determinar se no seu caso é necessária a administração da profilaxia pós-exposição

05

O tratamento tem a duração de 28 dias e é constituído por 3 fármacos que podem estar repartidos em dois ou três comprimidos diferentes.

06

A profilaxia pós-exposição, como qualquer tratamento com medicamentos, pode produzir alguns efeitos secundários, como dor de cabeça, mal-estar, vermelhidão na pele ou diarreia. Costumam ser leves e passageiros. Se algum destes efeitos for intenso ou prolongado, consulte o médico que prescreveu a profilaxia.



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA



FOR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia

Ajuntament de Barcelona

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org