

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) 1



Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) – это заболевания, которые передаются от одного человека другому при сексуальных контактах (в том числе через оральный секс).

| Как они передаются? | Какими симптомами сопровождаются? | Когда появляются первые симптомы? | Как ставится диагноз? | Какие анализы нужно сдавать? | Как лечить? | Эффективность презерватива |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|

ХЛАМИДИОЗ

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--|-------------------------|---------|
| Сперма, вагинальная и анальная смазка | Вагинальные или анальные выделения (часто начало заболевания проходит бессимптомно) | Симптомы проявляются в период от 2 до 6 недель после незащищенного полового акта | Анализ мочи либо соскоб | Начиная со второй недели после незащищенного полового акта | Назначаются антибиотики | Хорошая |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--|-------------------------|---------|

ГОНОРЕЯ

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|---|-------------------------|---------|
| Сперма, вагинальная и анальная смазка | Вагинальные или анальные выделения и жжение при мочеиспускании (чаще всего у женщин вообще нет никаких симптомов, а мужчины) | Симптомы проявляются в период от 2 до 6 дней после незащищенного полового акта | Анализ мочи либо соскоб | Начиная с 7 дня после незащищенного полового акта | Назначаются антибиотики | Хорошая |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|---|-------------------------|---------|

СИФИЛИС

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|-------------------------|---------|
| При бытовом контакте, а также при контакте с биологическими жидкостями из раны инфицированного человека | Чаще всего начало заболевания протекает без симптомов; иногда в месте инфицирования появляется язвочка (шанкр) | Симптомы проявляются в период от 3 дней до 3 месяцев после незащищенного полового акта | Анализ крови | Начиная с 4 недели после незащищенного полового акта | Назначаются антибиотики | Хорошая |
|---|--|--|--------------|--|-------------------------|---------|



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

COLABORA

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRAGONAGES

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Diputació Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL