


ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) 2



Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) – это заболевания, которые передаются от одного человека другому при сексуальных контактах (в том числе через оральный секс).

| Как они передаются? | Какими симптомами сопровождаются? | Когда появляются первые симптомы? | Как ставится диагноз? | Какие анализы нужно сдавать? | Как лечить? | Эффективность презерватива |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|---|--------|
| При бытовом контакте | Болезненные пузырьки в месте заражения (в 40% случаев заболевание протекает бессимптомно) | Симптомы проявляются в период от 2 до 21 дней после незащищенного полового акта | Анализ крови либо соскоб | Результаты соскоба являются действительными начиная с 12-го дня после незащищенного полового акта, анализ крови – через 3 месяца | Не поддается лечению, однако существуют препараты, способные облегчить состояние при обострении и | Плохая |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|---|--------|

ОСТРОКОНЕЧНЫЕ КОНДИЛОМЫ (ВИРУС ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА)

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|
| При бытовом контакте | Появление безболезненных выростов в области гениталий и заднего прохода (чаще всего протекает бессимптомно) | Симптомы проявляются в период от 1 до 8 месяцев после незащищенного полового акта | Обычно диагноз ставится после физического осмотра пораженных участков. Для оценки прогрессирования заболевания могут назначить вагинальный или анальный мазок | Как только начнут проявляться описанные симптомы | Существуют способы удаления выростов. Более 80% остроконечных кондилом проходят сами по себе через 24 после появления | Плохая. Существуют прививки, защищающие от заражения инфекцией, вызванной некоторыми типами вируса |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|

ТРИХОМОНИАЗ

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------|---|-----------------------------------|---------|
| Сперма и вагинальная смазка | Выделения из влагалища, жжение или боли при мочеиспускании. Болевые ощущения во время занятий сексом | Симптомы проявляются в период от 4 до 28 дней после незащищенного полового акта | Соскоб | Симптомы проявляются в период от 4 до 28 дней после незащищенного полового акта | Назначаются специальные препараты | Хорошая |
|-----------------------------|--|---|--------|---|-----------------------------------|---------|



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

COLABORA

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE INMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANS

SUBVENCIÓ

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

FOR SOLEMANIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Diputació Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL