


TABAC ET VIH



Le tabagisme est la principale cause évitable de maladie et de décès dans le monde

01


Le pourcentage de fumeurs parmi les personnes vivant avec le VIH est de deux fois celui observé dans la population générale.

02

Le tabac est plus dangereux pour les personnes vivant avec le VIH que pour les personnes non infectées.

03

Les personnes vivant avec le VIH ont un risque plus important de souffrir de certaines maladies:



04

Il existe de nombreuses stratégies pour vous aider à cesser de fumer. Dans de nombreux hôpitaux qui soignent les personnes atteintes du VIH, vous pouvez recevoir de l'aide.

05

En cessant de fumer on note rapidement des améliorations quant aux aptitudes physiques et, à terme, le risque de décès ou de maladies graves réduit.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya
Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS
Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE INNOVACIÓ I SALUT
TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org