

Fumar é a principal causa evitável de doença e de morte a nível mundial

TABACO E VIH



01

A percentagem de fumadores entre as pessoas com VIH é o dobro da observada na população em geral.

02

O tabaco é mais prejudicial para as pessoas com VIH do que para as pessoas não infectadas pelo vírus.

03

As pessoas com VIH correm um risco maior de sofrer de determinadas doenças:



04

Existem muitas estratégias para ajudá-lo/a a deixar de fumar. De facto, muitos hospitais que atendem pessoas com VIH podem também oferecer ajuda para deixar de fumar.

05

Quando se deixa de fumar, a capacidade física melhora rapidamente e, com o tempo, o risco de sofrer de doenças graves e o risco de morrer também se reduz.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya Agència de Salut Pública de Catalunya
Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS
Diputació Barcelona ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT
TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

¡POR FAVOR FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR!