


PRENDRE SES MÉDICAMENTS À L'HEURE INDIQUÉE



Pour que le traitement contre le VIH fonctionne correctement, il faut toujours prendre les médicaments à l'heure indiquée sans rater des doses.

Chaque prise de médicaments contre le VIH protège notre corps pendant plusieurs heures.

01 Il est essentiel de prendre les médicaments contre le VIH aux heures indiquées par le médecin et aux doses adéquates, c'est-à-dire telles qu'elles ont été prescrites. Par exemple, si vous avez besoin de prendre des médicaments deux fois par jour, chaque dose couvrira une période de douze heures.

02 Vous devez prendre la dose suivante avant que ne cessent les effets de la dose précédente.

03 Si vous prenez la dose avec retard, pendant un certain temps, il n'y aura pas de quantité suffisante de médicament dans votre corps et le VIH pourra infecter de nouvelles cellules.

04 Si vous prenez votre dose à l'heure indiquée, il y aura encore une quantité suffisante de médicament dans votre corps pour maintenir le VIH sous contrôle.

À SOULIGNER

- Il est essentiel de prendre les médicaments contre le VIH aux heures indiquées et aux doses appropriées, c'est-à-dire telles qu'elles ont été prescrites.
- Suivre ponctuellement son traitement antirétroviral permet qu'il y ait toujours une quantité suffisante de médicaments dans votre corps, ce qui maintient l'infection à VIH sous contrôle.
- Si vous ne prenez pas les médicaments tels qu'ils vous ont été prescrits, il se peut que le VIH soit plus difficile à traiter à l'avenir.

REMARQUES

Que peut-il arriver si je ne prends pas les médicaments à l'heure indiquée ?

Si vous ratez une prise de votre traitement plus d'une fois par mois, vous augmenterez le risque que votre traitement fonctionne moins bien ou ne fonctionne plus.

Il se peut que la quantité de VIH dans votre corps augmente, ce qui affaiblira le système immunitaire.

Il est possible qu'un des nouveaux virus soit « résistant » aux médicaments contre le VIH. Ce qui veut dire que les médicaments ne fonctionneront pas aussi bien.

Vous devrez peut-être changer de traitement, et les nouveaux médicaments peuvent ne pas être aussi faciles à prendre que ceux de votre traitement actuel ou entraîner plus d'effets secondaires.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia



Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
de Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



ETIS
GRUP DE TREBALL SOBRE
IMMIGRACIÓ I SALUT



TROPICAL
DISEASES



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org