


SYPHILIS



La syphilis est une infection sexuellement transmissible (IST) causée par la bactérie *Treponema pallidum*.



TRANSMISSION

Elle peut être contractée lors de relations sexuelles anales, vaginales ou orales sans préservatif avec une personne infectée. Les femmes enceintes peuvent transmettre la maladie à leur enfant.



SYMPTÔMES

Les symptômes sont les mêmes chez l'homme et la femme, ils varient selon le stade de l'infection et n'apparaissent pas toujours. Les premiers symptômes apparaissent généralement après 2-3 semaines. La syphilis se manifeste en quatre phases distinctes; par conséquent, la période d'apparition des symptômes dépend de la phase au cours de laquelle l'infection est détectée.

Syphilis primaire

Apparition d'un ulcère non douloureux (chancre) sur la partie du corps ayant été en contact avec la bactérie (particulièrement au niveau du pénis, de la vulve, du vagin ou de l'anus), généralement 2 à 3 semaines après l'infection. Cela peut prendre jusqu'à 6 semaines pour disparaître et peut passer inaperçu selon son emplacement.

Syphilis secondaire

Elle survient généralement 3 à 6 semaines après l'apparition du chancre. Ses symptômes incluent : éruption cutanée (paumes et plante des pieds), inflammation de la région génitale, taches blanches sur la bouche et ganglions enflammés. Même si l'on ne reçoit aucun traitement, en général les symptômes disparaissent mais l'infection continue de progresser. A ce stade, la syphilis est hautement transmissible par le sexe.

Syphilis latente

Lorsque les symptômes de la syphilis secondaire ont disparu, il se peut qu'il n'y ait pas de symptômes pendant plusieurs années, même si l'infection est présente.

Syphilis tertiaire

Plusieurs années après l'infection, environ 1 personne sur 10 atteinte de syphilis non traitée développe de graves problèmes neurologiques, ostéo articulaires ou cardiaques.



DIAGNOSTIC

Le diagnostic de la syphilis se fait par prise de sang et en présence d'ulcères, des échantillons peuvent également être prélevés. Les tests rapides de dépistage de la syphilis qui détectent la présence d'anticorps ne sont pas utiles pour diagnostiquer une réinfection.



TRAITEMENT

L'infection est traitée avec un antibiotique. Le traitement ne génère pas de protection à vie, vous pouvez donc contracter l'infection à nouveau.



PRÉVENTION

Le préservatif réduit le risque d'infection lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux. En cas de partage de sex toys, il est important d'utiliser un nouveau préservatif pour chaque personne et pour chaque pratique sexuelle. Il est recommandé d'éviter les rapports sexuels jusqu'à la fin du traitement et la disparition des symptômes.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD / DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

FOR SOLIDARIDAD / OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org