

SÍFILIS



A sífilis é uma infeç o sexualmente transmiss vel (IST) causada pela bact ria *Treponema pallidum*.



TRANSMISS O

Esta   pass vel de ser contra da quando se mant m rela  es sem preservativo com uma pessoa infetada atrav s de sexo anal, vaginal ou oral. As mulheres gr vidas podem transmitir a doen a ao seu filho.

SINTOMAS



Os s ntomas s o os mesmos tanto em homens como em mulheres, variam segundo a etapa da infe  o e nem sempre aparecem. Os primeiros s ntomas costumam aparecer ao fim de 2-3 semanas. A s filis manifesta-se em quatro fases diferenciadas, por essa raz o o per odo de apari  o dos s ntomas depender  da fase na qual se encontre a infe  o.

S filis prim ria

Surgimento de uma  lcera (cancro duro) n o dolorosa na parte do corpo que tiver estado em contato com a bact ria (sobretudo no p nis, vulva, vagina ou  nus), geralmente 2-3 semanas ap s a infe  o. Pode demorar a desaparecer at  seis semanas e, dependendo da sua localiza  o, pode passar desapercibida.

S filis secund ria

Costuma produzir-se entre as 3-6 semanas ap s o surgimento do cancro duro. Os s ntomas incluem: erup  o cut nea (palmas das m os e dos p s), inflama  o na zona genital, manchas brancas na boca e gl ndulas inflamadas. Os s ntomas podem desaparecer mesmo sem receber tratamento, contudo a infe  o continua a progredir. Nesta etapa a s filis   altamente transmiss vel por via sexual.

S filis latente

Quando os s ntomas da s filis secund ria desapareceram, pode n o haver s ntomas durante v rios anos, mesmo que a infe  o esteja presente.

S filis terci ria

Muitos anos depois da infe  o, aproximadamente 1 de cada 10 pessoas com s filis n o tratada acabar  por desenvolver graves problemas neurol gicos, osteoarticulares ou card acos.



DIAGN STICO

O diagn stico da s filis faz-se atrav s de uma an lise de sangue e, no caso da presen a de  lceras, tamb m se podem colher muestras. As provas r pidas da s filis que detetam a presen a de anticorpos n o s o  teis para diagnosticar uma reinfe  o.



TRATAMIENTO

A infe  o cura-se com um antibi tico. O tratamento n o gera prote  o para toda a vida, raz o pela qual se pode voltar a contrair a doen a.



PREVEN O

O preservativo reduz o risco de infe  o no sexo vaginal, anal ou oral. No caso de se partilharem brinquedos sexuais,   importante usar um preservativo novo para cada pessoa e para cada pr tica sexual.   recomend vel evitar ter rela  es sexuais at  finalizar o tratamento e desaparecerem os s ntomas.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD P BLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPA A / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Generalitat de Catalunya Ag ncia de Salut P blica de Catalunya

Generalitat de Catalunya Departament de Just cia

Ajuntament de Barcelona /  REA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputaci  Barcelona /  REA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACI  I SALUT

TROPICAL DRASSANES



 TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREG NTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org