


СИФИЛИС



Сифилис – это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), возбудителем которой является *Treponema pallidum*.



ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

Сифилисом можно заразиться во время секса без презерватива с инфицированным человеком, будь то анальный, оральный или вагинальный секс. Беременная женщина может передать инфекцию своему ребенку.



СИМПТОМЫ

Симптомы одинаковы у женщин и мужчин и варьируются в зависимости от стадии прогрессирования инфекции, при этом они не всегда заметны. Первые симптомы могут появляться через 2-3 недели. Сифилис проявляет себя в четырех фазах, поэтому симптомы зависят от фазы инфекции.

Первичный сифилис

На том участке тела, который контактировал с бактерией (особенно пенис, вульва, влагалище или задний проход), появляется безболезненная язва (шанкр), обычно через 2-3 недели после инфицирования. Язва может заживать до 6 недель, и в зависимости от её месторасположения её можно даже не заметить.

Вторичный сифилис

Обычно развивается через 3-6 недель после появления шанкра. Характерны сыпь на коже (ладони и подошва), воспаление половых органов, белые высыпания на коже и воспаленные миндалины. Даже если больной не лечится, симптомы обычно проходят, однако инфекция продолжает прогрессировать. На этом этапе сифилис крайне заразен для половых партнеров.

Латентный сифилис

Когда исчезают симптомы вторичного сифилиса, он может не давать о себе знать несколько лет, хотя инфекция присутствует в организме.

Третичный сифилис

Много лет спустя после заражения приблизительно у 1 из 10 человек с нелеченым сифилисом развиваются серьезные повреждения нервной системы, костей, суставов и сердца.



ДИАГНОЗ

Сифилис диагностируется по результатам анализа крови, при наличии язв их также можно использовать для исследования. Быстрые тесты на сифилис, реагирующие на наличие антител, не работают при диагностике повторного инфицирования.



ЛЕЧЕНИЕ

Инфекция лечится антибиотиком, однако лечение не гарантирует пожизненный иммунитет. Это значит, что сифилисом можно заразиться повторно.



ПРОФИЛАКТИКА

Использование презерватива сокращает риск заражения при вагинальном, анальном и оральном сексе. При совместном использовании секс-игрушками важно надевать новый презерватив с каждым партнером и каждой секс-практикой. Рекомендуется воздержаться от половой жизни до окончания лечения или исчезновения симптомов.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org