

السيلان (بالإسبانية كونيوريا Gonorrhea) هو عدوى ينتقل جنسياً (من بين الأمراض المتنقلة عبر الجنس التي يرمز لها ب ITS) ناتجة عن بكتيريا تسمى ب كونوكو (بالإسبانية Neisseria Gonorrhoeae o gonococo).

01 الإنتقال

يمكن الإصابة بهذه العدوى أثناء علاقات جنسية بدون إستعمال الغشاء الواقي مع شخص مصاب من خلال ممارسة الجنس الشرجي أو المهلي أو الفموي. يمكن للمرأة الحامل أن تنقل المرض إلى طفلها.

02 الأعراض

أكثر من 50% من النساء و 10% من الرجال ليس لديهم أعراض. العدوى في المستقيم والحلق عادة لا تنتج أي أعراض. تظهر عادة ما بين يومين إلى سبعة أيام بعد العلاقة الجنسية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر في وقت لاحق أو متأخر. هذه الأعراض تتمثل في:

عند النساء

- تغييرات في اللون، الرائحة أو كمية الإفرازات المهبلية
- نزيف بين الدورات الشهرية أو زيادة تواتر الحيض
- الشعور بحرقان عند التبول
- قد يكون هناك ألم أو إزعاج في أسفل البطن

عند الرجال

- الشعور بحرقان عند التبول
- تهيج أو ألم حول مجرى البول
- إفرازات قيحية في القضيب
- قد يكون هناك ألم في الخصيتين
- عدم الراحة عند القذف

03 التشخيص

عادة ما يتم تشخيص السيلان عن طريق فحص البول أو أخذ عينات من المستقيم، مجرى البول والبلعوم.

04 العلاج

يتم علاج العدوى بمضادات حيوية. هذا العلاج لا يمنحك حماية مدى الحياة، لذلك يمكنك أن تصاب بالعدوى مرة أخرى.

05 الوقاية

الغشاء الواقي يقلل من خطر العدوى في الإتصال الجنسي المهلي أو الشرجي أو عن طريق الفم. إذا تمت مشاركة اللعب الجنسية، فمن المهم إستخدام غشاء واقي جديد لكل شخص وعند كل ممارسة جنسية. يوصى بتجنب الإتصال الجنسي حتى نهاية العلاج وإختفاء الأعراض.

السيلان



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



FOR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org



¡POR FAVOR FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR!