

## CHLAMYDIA



La chlamydia est une infection sexuellement transmissible (IST) causée par la bactérie *Chlamydia trachomatis*.



### 01 TRANSMISSION

Elle peut être contractée lors de rapports sexuels anaux, vaginaux ou oraux sans préservatif avec une personne infectée. Les femmes enceintes peuvent transmettre la maladie à leur enfant.



### 02 SYMPTÔMES

Plus de 70% des femmes et 50% des hommes infectés par la chlamydia ne présentent aucun symptôme. Lorsqu'ils apparaissent, ils se manifestent généralement 2 à 14 jours après un rapport sexuel, mais ils peuvent prendre jusqu'à 21 jours pour apparaître. Les symptômes peuvent inclure :



#### Chez les femmes

- Changements de la couleur, de l'odeur ou de la quantité de sécrétions vaginales
- Règles plus importantes ou saignements entre les règles
- Saignement après rapport sexuel
- Sensation de brûlure en urinant
- Douleur ou gêne dans le bas de l'abdomen
- Si elle n'est pas traitée, elle peut causer une maladie inflammatoire pelvienne



#### Chez les hommes

- Sensation de brûlure en urinant
- Sécrétion au bout du pénis
- Irritation ou douleur autour de l'urètre
- Douleur ou gêne au niveau des testicules
- Sécheresse ou maux de gorge

Chez l'homme comme chez la femme, lorsque l'infection se situe dans le rectum, elle ne provoque souvent aucun symptôme ; mais en cas de symptômes ceux-ci peuvent provoquer de la douleur, des pertes ou des saignements rectaux.



### 03 DIAGNOSTIC

Il peut être diagnostiqué avec des échantillons prélevés dans le pharynx et / ou le rectum. Pour l'infection urétrale, une analyse d'urine est habituellement effectuée.



### 04 TRAITEMENT

L'infection est traitée avec un antibiotique. Ce traitement ne génère pas de protection à vie, vous pouvez donc contracter l'infection à nouveau.



### 05 PRÉVENTION

Le préservatif réduit le risque d'infection lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux. En cas de partage de sex toys, il est important que chaque personne utilise un nouveau préservatif et pour chaque pratique sexuelle. Il est recommandé d'éviter les rapports sexuels jusqu'à la fin du traitement et la disparition des symptômes.

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

**SUBVENCIÓN**

GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y IGUALDAD

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA GENERAL DE SALUD PÚBLICA  
SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL

FOR SOLIDAR EDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya  
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona  
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona  
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

**COLABORA**

ETIS  
EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org