

الهربس التناسلي هو عدوى تنتقل عن طريق الإتصال الجنسي (من بين الامراض المتنقلة جنسياً التي يرمز لها ب ITS) بسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 2 (VHS-2). فيروس الهربس البسيط من النوع 1 (VHS-1) - الذي يصيب عادة الشفتين والمناطق القريبة - في بعض الأحيان. يمكن أن يؤثر على المنطقة التناسلية والشرجية.

InfoVHtal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH

153

طبعة 2019 ÁRABE

الهربس التناسلي

الإنتقال

يمكن أن تصاب بهذه العدوى أثناء ممارسة علاقات جنسية دون إستعمال الواقي الذكري من خلال الجنس الشرجي، المهبلي، الفموي أو عن طريق الإتصال التناسلي الوثيق مع شخص مصاب. يمكن أن ينتقل أيضاً عن طريق الإصابات الجلدية المخاطية أو من خلال إفرازات يوجد فيها الفيروس، حتى لو لم تكن هناك إصابات.

بمجرد حدوث العدوى بفيروس الهربس البسيط VHS، العدوى تبقى في الجسم إلى الأبد ولا يتم التخلص منها. كونها عدوى لا تعالج، الشيء الذي يدفع الأشخاص المصابون إلى تفشي المرض بشكل دوري.

يمكن للمرأة الحامل أن تنقل المرض إلى طفلها. إذا أصيبت المرأة بالهربس التناسلي أثناء الحمل، فمن المستحسن أن تتلقى العلاج الكافي للحد من خطر انتقال العدوى.

الأعراض

أكثر من 50% من الأشخاص المصابين بالهربس التناسلي ليس لديهم أعراض وفي حالة ظهور أعراض، عادة ما تكون خفيفة للغاية. عند ظهور أعراض، من المحتمل أن تكون العدوى قد حدثت قبل فترة طويلة من الأسابيع أو الأشهر أو حتى سنوات قبل ذلك. العلامة المميزة للعدوى هي ظهور تآليل مؤلمة عند نقطة الإصابة (الفرج أو المهبل أو القضيب أو فتحة الشرج أو المستقيم أو نادراً جداً في الفم). الإحساس بالوخز والحكة أو آلام الأفات هي أيضاً من الأعراض المميزة. ثم تنفجر هذه التآليل، وتفرز سوائل، مخلقة آثار أو إصابات تقرحية مؤلمة تستغرق عدة أسابيع لعلاجها. في كثير من الأحيان، بعد شفاء الإصابات، تظهر الأعراض مرة أخرى. هذا الوضع يسمى إندلاع.

التشخيص


في بعض الأحيان، يمكن تشخيصه من خلال ملاحظة مواصفات الآفات أو الإصابات. عادة، يتم أخذ العينات من التآليل أو القرحة لإجراء الإختبارات في المختبر.

العلاج

لا يمكن علاج الهربس التناسلي، ولكن بعض الأدوية المضادة للفيروسات تمنع أو تقلل من مدة إنتشار المرض وتقلل من احتمال إنتقال الفيروس.

الوقاية

إستعمال الواقي الذكري يقلل من خطر إنتقال العدوى، لكنه لا يمنع الإصابة، لأن المناطق المصابة قد تكون خارج المنطقة المحمية بالواقي الذكري. ينصح بتجنب الإتصال الجنسي حتى نهاية العلاج وإختفاء الأعراض.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN:

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BENEFICIO SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y POLÍTICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL

FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona
ÀREA DE BENEFIT SOCIAL

COLABORA:

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE INMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANES

¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

