

A tricomoníase é uma infeção sexualmente transmissível (IST) causada por um parasito chamado *Trichomonas vaginalis.*

TRICOMONÍASE









TRANSMISSÃO

Pode-se contrair quando se mantêm relações sexuais sem preservativo com uma pessoa que tem a infeção.

Nas mulheres, as áreas do corpo afetadas com mais frequência são a vulva, a vagina ou a uretra; nos homens, a uretra. Não é frequente que o parasito infete outras partes do corpo, como as mãos, a boca ou o ânus.



SINTOMAS

O 50% das mulheres e o 80% dos homens com infeção por tricomonas não apresenta sintomas. Quando aparecem sintomas, estes podem ir desde uma irritação leve até uma inflamação significativa. Ocorrem geralmente de 5 a 28 dias depois de ter mantido um contato sexual sem proteção com uma pessoa infetada. Às vezes, esse período pode ser maior.

Os sintomas incluem:



Em mulheres

Comichão, ardor, vermelhidão ou dor nos genitais, desconforto ao urinar, ou uma secreção que pode ser transparente, branca, amarelada ou esverdeada e com uma cor inusual.



Nos homens

Comichão ou irritação no pénis, ardor depois de urinar ou ejacular, podem apresentar também alguma secreção.



DIAGNÓSTICO

É necessária uma amostra da zona genital afetada de forma a realizar o diagnóstico.



TRATAMENTO

A infeção cura-se com um antibiótico. Este trataemnto não gera proteção para toda a vida, razão pela qual se pode voltar a contrair a infeção.



PREVENÇÃO

O preservativo reduz o risco de infeção no caso de sexo vaginal, anal ou oral. Se se partilharem brinquedos sexuais, é importante usar um preservativo novo para cada pessoa e para cada prática sexual. É recomendável evitar manter relações sexuais até finalizar o tratamento e os sintomas desaparecerem.