

يمكن للعديد من الأمراض المنقولة جنسياً (ITS) أن تنتقل عن طريق الجنس الفموي. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب زيادة أو نقصان نسبة خطورة هذا التنقل.

يمكن لأي شخص يمارس الجنس عن طريق الفم مع شريك مصاب أن يصاب بعدوى منقولة جنسياً ITS في الفم، الحلق، الأعضاء التناسلية، فتحة الشرج (الدبر) أو المستقيم. خطورة الإصابة ب ITS أو نقلها من خلال الجنس الفموي تعتمد على عدة عوامل:

- استخدام طرق تعمل كحاجز (مثل الواقي الذكري)
- الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ITS على وجه الخصوص
- عدد العلاقات الجنسية بشكل عام وعدد مرات ممارسة الجنس عن طريق الفم بشكل خاص
- تردد الأمراض المنقولة جنسياً بين السكان الذين ينتمي إليها الشريك الجنسي
- صحة الفم
- وجود تقرحات أو جروح في الفم و/ أو على الأعضاء التناسلية

ومع ذلك، على العموم، لا توجد دراسات توضح ما إذا كان أي من هذه العوامل يزيد من خطر إكتساب أو نقل الأمراض المنقولة جنسياً ITS.

الجوانب العامة لانتقال الأمراض المنقولة جنسياً ITS

بشكل عام، يجدر معرفة ما يلي:

- قد تؤدي ممارسة الجنس الفموي مع شريك مصاب بعدوى تناسلية أو على مستوى فتحة الشرج (خاصة على القضيب) إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً ITS في الفم أو الحلق.
- قد يؤدي تلقي الجنس الفموي من شريك مصاب بعدوى في الفم أو الحلق إلى زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المنقولة جنسياً في القضيب (أحيانا المهبل، فتحة الشرج أو المستقيم).
- من الممكن أن يكون لديك عدوى منقولة جنسياً في أكثر من موقع في نفس الوقت، على سبيل المثال في الحلق والأعضاء التناسلية.
- بعض الأمراض المنقولة جنسياً ITS التي يمكن أن تنتقل عن طريق الجنس الفموي، يمكن أن تنتشر في وقت لاحق في جميع أنحاء الجسم (مثل الزهري، السيلان أو الالتهابات المعوية).
- يمكن أن يشكل الجنس عن طريق الفم، الشرج أو الدبر (anilingus rimming) خطراً لانتقال التهاب الكبد A أو B، الطفيليات المعوية (مثل Giardia intestinalis) وبعض البكتيريا (مثل Escherichia coli –o E. coli– y Shigella).
- يمكن أن تنتقل العدوى المنقولة جنسياً ITS أثناء العلاقات الجنسية حتى عندما لا تظهر أعراض على الشخص المصاب.
- قد تزيد بعض الأمراض المنقولة جنسياً ITS من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية VIH.
- يمكن التقليل من خطر انتقال معظم الأمراض المنقولة جنسياً باستخدام طرق تعمل كحاجز، مثل الواقي الذكري (سواء الخارجي - للقضيب - أو الداخلي - للمهبل والشرج أو الدبر) أو صافنح اللاتكس أو متعدد اليوريثين التي يتم وضعها بين الفم والفرج أو فتحة الشرج. يمكن صنع هذه الصافنح عن طريق قطع الواقي الذكري على شكل مربعات.
- إذا كنت شخصاً نشيطاً جنسياً، فقد يكون دمج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية VIH وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً ITS في الفحوصات الصحية الروتينية، استراتيجية للرعاية الذاتية.

InfoVital


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH

160

ÁRABE

EDICIÓN 2020

الجنس الفموي والأمراض المنقولة جنسياً (ITS)



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA



SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
MINISTERIO DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya



Diputació de Barcelona
ÀREA DE BIENESTAR SOCIAL



Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

COLABORA



Vall d'Hebron
Barcelona Campus Hospital



eSPiC
Equip de salut pública i comunitària



ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE IMAGINACIÓ I SALUT

¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org



مخاطر العدوى بالكلاميديا والسيلان				موقع الكلاميديا والسيلان
عند الشخص الذي يتلقى الجنس الفموي في:		عند الشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم في:		
الشرج (الدبر)	المهبل	القضيب	الحلق	
			●	القضيب / المسالك البولية
			* ●	المهبل / المسالك البولية
			* ●	فتحة الشرج (الدبر)
* ●	* ●	●		الحلق

(* لا توجد دراسة عميقة)

مخاطر عدوى مرض الزهري		موقع مرض الزهري
عند الشخص الذي يتلقى الجنس الفموي	عند الشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم:	
●	●	الأعضاء التناسلية
●	●	الشفاه والفم
●	●	الحلق
●	●	الشرج (الدبر)

مخاطر الإصابة بالعدوى					موقع الهربس
عند الشخص الذي يتلقى الجنس الفموي في:			عند الشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم في:		
الأرداف	فتحة الشرج أو الدبر	منطقة الأعضاء التناسلية	الحلق	الشفاه والفم	
●	●	●			الشفاه والفم
●	●	●			الحلق
			●	●	منطقة الأعضاء التناسلية
			●	●	فتحة الشرج أو الدبر
			●	●	الأرداف

مخاطر العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (VPH)				موقع فيروس الورم الحليمي البشري VPH (VHS 1 y 2)
عند الشخص الذي يتلقى الجنس الفموي في:			عند الشخص الذي يمارس الجنس عن طريق الفم في:	
فتحة الشرج أو الدبر	المهبل أو المنطقة التناسلية	القضيب أو المنطقة التناسلية	الحلق	
			●	القضيب أو المنطقة التناسلية
			●	المهبل أو المنطقة التناسلية
			* ●	فتحة الشرج أو الدبر
* ●	* ●	* ●		الحلق

(* لا توجد دراسة عميقة)

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

