

## SEXUL ORAL ȘI ITS



Multe infecții cu transmitere sexuală (ITS) pot fi luate sau transmise prin sex oral. Cu toate acestea, există mai mulți factori care ar putea determina riscul menționat să crească sau să scadă.

**Oricare persoană ce are relații sexuale orale cu un partener infectat ar putea obține o boală ITS la nivelul gurii, a gâtului, a organelor genitale, a anusului sau a rectului.** Riscul de a contracta sau de a transmite o ITS prin sex oral depinde de mai mulți factori:

- Utilizarea metodelor de barieră (cum ar fi prezervativele)
- ITS în special
- Numărul de relații sexuale în general și numărul de sex oral în special
- Frecvența ITS în rândul populației din care face parte partenerul sexual
- Sănătatea buco-dentală
- Prezența tăieturilor sau rănilor în gură și / sau pe organele genitale

Cu toate acestea, în multe cazuri, nu au fost efectuate studii care să demonstreze dacă unul dintre aceste riscuri crește riscul de a dobândi sau de a transmite ITS.

### 01 ASPECTE GENERALE ALE TRANSMISIEI ITS

**În general, merită să știți că:**

- Făcând sex oral cu un partener care are o infecție genitală sau anorectală (în special la nivelul penisului) ar putea crește riscul de a dobândi ITS la gură sau gât.
- Primind sex oral de la un partener cu infecție la nivelul gurii sau a gâtului poate crește, de asemenea, riscul apariției unor ITS în penis (și eventual la vagin, anus sau rect).
- Este posibil să existe o ITS în mai multe locații în același timp, de exemplu în gât și pe organele genitale.
- Unele dintre ITS care pot fi transmise prin practica sexuală, prin sex oral se pot răspândi ulterior în tot corpul (de exemplu, sifilis, gonoree sau infecții intestinale)
- *Anilingus* sau *rimming* (sex oral-anal) pot, de asemenea, să prezinte riscul de transmitere a hepatitei A sau B, a paraziților intestinali (cum ar fi *Giardia Intestinalis*) și a anumitor bacterii (precum *Escherichia coli* – sau *E. coli*– și *Shigella*).
- ITS pot fi transmise în timpul actului sexual chiar și atunci când persoana infectată nu are simptome.
- Unele ITS pot crește riscul de a se infecta cu HIV.
- Riscul de transmitere a majorității ITS poate fi redus folosind metode de barieră, cum ar fi prezervativele (atât externe - pentru penis - cât și interne - pentru vagin și anus) sau folii de latex sau poliuretan care sunt plasate între gură și vulvă sau anus. Aceste foi pot fi făcute prin tăierea unui pătrat dintr-un prezervativ.
- O strategie de auto-îngrijire pentru persoanele active sexual ar putea fi încorporarea testelor pentru HIV și alte ITS în analizele de sănătate de rutină.

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BENEFICIO SOCIAL  
SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD  
MINISTERIO DE SANIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA

FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya Agència de Salut Pública de Catalunya  
Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS  
Diputació de Barcelona ÀREA DE BENEFICI SOCIAL

COLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT  
Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospitalari eSPiC Equip de salut pública i comunitària



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

Localizarea Chlamydiei și gonoreei	RISCOL INFECȚIEI CU CLAMYDIE ȘI GONORREA			
	La persoana care PRACTICĂ sexul oral în:		La persoana care PRIMEȘTE sexul oral în:	
	Gât	Penis	Vaginul	Anus
Penisul / tractul urinar	●			
Vagina / tractul urinar	● *			
Anus-rect	● *			
Gât		●	● *	● *

(\*) Nu a fost studiat în profunzime

Locația sifilisului	RISCOL INFECȚIEI CU SIFILIS	
	La persoana care PRACTICĂ sexul oral în:	La persoana care PRIMEȘTE sexul oral în:
Genitale	●	●
Buze și gură	●	●
Gât	●	●
Anus-rect	●	●

Locația Herpes (HSV 1 și 2)	RISCOL INFECȚIEI CU HERPES				
	La persoana care PRACTICĂ sexul oral în:		La persoana care PRIMEȘTE sexul oral în:		
	Labios y boca	Gât	Zona genitală	Anus-rect	Fund
Buze și gură			●	●	●
Gât			●	●	●
Zona genitală	●	●			
Anus-rect	●	●			
Fund	●	●			

Locație HPV	RISCOL DE INFECȚIE CU VIRUSUL PAPILOMEI UMANE (HPV)			
	La persoana care PRACTICĂ sexul oral în:		La persoana care PRIMEȘTE sexul oral în:	
	Gât	Penisul sau zona genitală	Vagina sau zona genitală	Anus-rect
Penisul sau zona genitală	●			
Vagina sau zona genitală	●			
Anus-rect	● *			
Gât		● *	● *	● *

(\*) Nu a fost studiat în profunzime



ȚIENES DUDAS

SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org