

## TESTE DE DIAGNOSTIC ȘI SCREENING PENTRU COVID-19



Există diferite teste pentru detectarea infecției prin SARS-CoV-2, coronavirusul care provoacă COVID-19. Unele sunt folosite pentru diagnosticarea bolii; altele, fără îndoială, sunt recomandate numai pentru screeningul persoanelor asimptomatice cu risc crescut de expunere. În Spania puteți avea acces la testele de diagnostic numai pe bază de prescripție medicală.

### 01 TIPURI DE TESTE

În prezent, există mai multe tipuri de testare pentru SARS-CoV-2 la care se prezintă diferențe mari. Unele detectează coronavirusul direct (cum ar fi testele PCR sau antigenul); altele îl detectează indirect (cum ar fi testele serologice). Unele necesită echipamente specifice și personal specializat (cum ar fi teste de laborator) pentru a le efectua; altele necesită un echipament specific redus, iar rezultatele sunt furnizate în câteva minute (cum ar fi testele rapide). În cele din urmă, unele sunt utilizate pentru a diagnostica boala la persoanele cu suspiciune de infecție cu SARS-CoV-2 (cum ar fi teste PCR sau antigenul), în timp ce altele sunt utilizate doar pentru a detecta infecția la persoanele vulnerabile sau asimptomatice mai expuse la infecție (cum ar fi testele serologice sau PCR).

În Spania, testul standard pentru diagnosticul COVID-19 este testul PCR.

### 02 CUI ÎI ESTE DESTINAT TESTUL?

1) În Spania, orice **persoană suspectată** de o infecție cu SARS-CoV-2 va fi supusă unui test PCR în primele 24 de ore. Un caz suspect este orice persoană cu o imagine clinică a infecției respiratorii acute cu debut brusc de orice severitate care ar include, printre alte simptome, cu febră, tuse sau senzație de dificultăți de respirație.

2) Dacă rezultatul PCR al unui **caz suspect** este pozitiv, se recomandă efectuarea PCR la **contactele strâns** cu obiectivul principal de a detecta noi cazuri pozitive din timp.

Este clasificat drept **contact strâns**:

- Oricine ar fi acordat îngrijiri unui caz.
- Oricine ar fi fost în același loc cu un caz, la o distanță mai mică de 2 metri și mai mult de 15 minute.
- Oricare persoană care- pe un avion, tren sau alt mod de transport pe distanțe lungi - se află pe o rază de două locuri a cazului infectat.

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL  
SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD  
MINISTERIO DE SANIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA  
SECRETARÍA DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA

FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya  
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona  
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona  
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS EQUIP DE TREBALL SOBRE INMIGRACIÓ I SALUT

Vall d'Hebron eSPiC Equip de salut pública i comunitària








¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS







Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

¡POR FAVOR FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULARI!








### TEST DE ARN: PCR

Detectare	Proba	Echipment	Timp	Sensibilitate	Utilitate
 <p>Detectează prezența materialului genetic (ARN) din coronavirus. Adică, detectează dacă persoana are o infecție SARS-CoV-2 activă</p>	 <p>Nasofaringian sau orofaringian folosind un tampon de bumbac (tip bastonaș de bumbac)</p>	 <p>Test de <b>laborator</b></p>	 <p>3-4 ore</p>	 <p>Ridicată (&gt;90%)</p>	<p>Diagnosticul de la COVID-19</p>

### TESTE DE ANTIGENI

Detectare	Proba	Echipment	Timp	Sensibilitate	Utilitate
 <p>Detectează prezența antigenilor (proteine pe suprafața coronavirusului). Adică, detectează dacă persoana are o infecție SARS-CoV-2 activă</p>	 <p>Nasofaringian sau orofaringian folosind un tampon de bumbac (tip bastonaș de bumbac)</p>	 <p>Test de <b>laborator</b></p>	 <p>Test de <b>laborator:</b> 24 ore</p>	 <p>Test de <b>laborator:</b> ridicată (&lt;80%)</p>	<p>Test de <b>laborator:</b> Diagnostic de la COVID-19</p>
		 <p>Test <b>rapid:</b> Se efectuează în prezența pacientului</p>	<p>Test <b>rapid:</b> 10- 15 minute</p>	<p>Test <b>rapid:</b> scăzută (&lt;60%)</p>	<p>Test <b>rapid:</b> Diagnostic de la COVID-19</p>

### TESTE SEROLOGICE

Detectare	Proba	Echipment	Timp	Sensibilitate	Utilitate
 <p>Detectează prezența anticorpilor produși împotriva coronavirusului la aproximativ 7 zile de la începutul infecției. Prin urmare, acestea sunt dovezi indirecte că infecția este activă sau că a trecut</p>	 <p><b>Test de laborator:</b> Extracție de sânge pe cale venoasă</p>	 <p>Test de <b>laborator</b></p>	 <p>Test de <b>laborator:</b> 24 ore</p>	 <p>Test de <b>laborator:</b> Foarte ridicată (&gt;90%)</p>	<p>Test de <b>laborator:</b> Diagnostic de la COVID-19</p>
	 <p><b>Test rapid:</b> extragere de sânge pe calea capilară</p>	 <p>Test <b>rapid:</b> Se efectuează în prezența pacientului</p>	<p>Test <b>rapid:</b> 10- 15 minute</p>	<p>Test <b>rapid:</b> ridicată (&gt;80%)</p>	<p>Test <b>rapid:</b> Diagnostic de la COVID-19</p>



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

## 03

### STUDII DE SCREENING

Studiile de screening sunt cele efectuate la **persoanele asimptomatice**:

În Spania, **screening-ul prin PCR sau teste serologice nu este recomandat la persoanele asimptomatice și cu risc scăzut**. Acest lucru se datorează dificultăților de interpretare a rezultatelor la aceste persoane și a implicațiilor în gestionarea acestora.

Dacă autoritățile sanitare o consideră, **pot fi efectuate studii de screening prin teste serologice la populații asimptomatice vulnerabile sau la cei care prezintă un risc mai mare de expunere**, cum ar fi personalul din domeniul sănătății sau sociosanitar sau rezidenții din case de îngrijire a bătrânilor sau alte centre sociosanitare.

**În prezent nu se recomandă efectuarea testului PCR la persoanele asimptomatice, cu excepția anumitor strategii de screening propuse în cadrul sistemului de sănătate** pentru depistarea precoce a cazurilor în rândul contactelor apropiate, în populațiile vulnerabile în contextul focarelor sau a unelor actuații asistențiale previi (cum ar fi, de exemplu, intervenții chirurgicale).

**Sursă:** Ministerul de Sănătate. Institutul de Sănătate Carlos III. Estrategia de Detectare Precoce, Vigilanță și Control de COVID-19. Actualizat la 9 iulie de 2020. Disponibil în: [https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19\\_Estrategia\\_vigilancia\\_y\\_control\\_e\\_indicadores.pdf](https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf)

### TELEFONE GRATUITE PENTRU INFORMAȚII ASUPRA COVID-19

Andalucia	900 400 061 / 955 545 060
Aragón	976 696 382
Asturias	984 100 400 / 900 878 232 / 112 + 1
Cantabria	900 612 112
Castilla-La Mancha	900 122 112
Castilla y León	900 222 000
Catalonia	061
Ceuta	900 720 692
C. Madrid	900 102 112
C. Valenciană	900 300 555
Extremadura	900 222 012
Galicia	900 400 116
Insule Baleare	902 079 079 / 971 437 079
Insule Canarias	900 112 061
La Rioja	941 298 333
Melilla	112
Murcia	900 121 212
Navarra	948 290 290
Țara Vască	900 203 050



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
[consultas@gtt-vih.org](mailto:consultas@gtt-vih.org)