

تكون فعالية لقاحات الأطفال الحاملين لفيروس VIH جيدة وتوفر الحماية ، على الرغم من أنها أقل من تلك التي يتم إنتاجها عند عامة السكان وتدوم أقل. يعتبر عدد خلايا CD4 أفضل مؤشر للاستجابة للقاحات. في حالة إصابة الطفل بنقص المناعة، يوصى ببدء أو ضبط العلاج المضاد للفيروسات لإستعادة المناعة قبل التلقيح من أجل تحسين الإستجابة. يحتوي هذا الملف على معلومات وإرشادات قد تكون مفيدة للآباء أو أشخاص مختصين برعاية للأطفال والمراهقين المصابين بفيروس VIH.

InfoVIHtal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH

174

العربية

أصدار 2021

توصيات بشأن لقاحات للأطفال والمراهقين الحاملين لفيروس VIH

توصيات بشأن لقاحات للأطفال والمراهقين الحاملين لفيروس VIH

التعليقات والتحذيرات	جرعات	لقاح
<p>قبل الولادة: (dTpa) جرعة واحدة من dTpa في كل حمل ابتداء من الأسبوع 27 من الحمل، ولكن من الأفضل في الأسبوع 27 أو 28.</p> <p>التلقيح الروتيني في سن 6 سنوات: سيتم إعطاء لقاح DTPa/VPI مشترك للأطفال الذين تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح عند بلوغهم سن 6 سنوات. أولئك الذين تم تلقيحهم بأربع جرعات في المجموع سيحصلون على جرعة واحدة من dTpa.</p>	<p>3 جرعات: في عمر 2 و 4 و 11 شهراً</p> <p>4 جرعات: في عمر 2 و 4 و 6 و 18 شهراً</p>	<p>الخدق الكزاز والسعال الديكي</p> <p>DTPa-VPI • dTpa •</p>
<p>التلقيح الروتيني في سن 6 سنوات: سيتم إعطاء لقاح DTaP / IPV مشترك للأطفال الذين تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح عندما يبلغون سن 6 سنوات. أولئك الذين تم تلقيحهم بأربع جرعات في المجموع سيحصلون على جرعة واحدة من dTpa.</p>	<p>3 جرعات: في عمر 2 و 4 و 11 شهراً</p> <p>4 جرعات: في عمر 2 و 4 و 6 و 18 شهراً</p>	<p>شلل الأطفال</p>
<p>تطعيم الأطفال: يتم إعطاء ثلاث جرعات من DTPa-VPI-VHB+HiB</p> <p>تلقيح المراهقين والشباب: بالنسبة للأشخاص الغير الملقحين سابقاً، حتى سن 18 عاماً، سيتم إعطائهم جرعة واحدة.</p>	<p>3 جرعات: في عمر 2 و 4 و 11 شهراً</p>	<p>BiH (المستدمية النزلية من النوع ب) PRP-T • DTPa-VPI-VH • B+HiB</p>



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ENDESMOS SOCIALES Y AGENDA 2030



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD
SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SOBRE EL SIDA

✓ POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia



Generalitat de Catalunya

Salut/ Agència de Salut Pública de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



ETIS
Equip de Treball sobre Immigració i Salut



Vall d'Hebron
Hospital Universitari de Barcelona



eSPiC
Equip de salut pública i comunitària



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

¡POR FAVOR FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR!

التعليقات والتحذيرات	جرعات	لقاح
<p>تلقيح في الطفولة:</p> <ul style="list-style-type: none"> سيتم تلقيحك بجدول زمني من ثلاث جرعات إذا تم فحص المرأة الحامل قبل الولادة سيتم تلقيح أطفال الأمهات اللواتي لديهن: AgHBs إيجابي، بأربع جرعات سيتم إعطاء الجرعة الأولى في أول 24 ساعة من الحياة مع إعطاء الغلوبولين المناعي المضاد لـ HB. إذا كان مستوى الأجسام المضادة منخفضًا جدًا في فترة 4-8 أسابيع، يؤخذ بعين الاعتبار إمكانية إعادة التلقيح (3 جرعات في 6 أشهر) بلقاح البالغين. <p>تلقيح المراهقين والشباب:</p> <p>بالنسبة للأشخاص الغير الملقحين سابقًا، حتى سن 18 عامًا ، سيتم إعطائهم 3 جرعات (في 0 و 1 و 6 أشهر).</p>	<p>3 جرعات: في عمر 2، 4، و 11 شهرًا</p> <p>4 جرعات: في عمر 0، 2، 4 و 11 شهرًا</p>	<p>التهاب الكبد ب (VHB)</p>
<p>أقل من عامين:</p> <p>VNC13 (2، 4، 6 و 11 شهرًا) + PNV23 (إبتداء من 24 شهرًا). جرعة معززة من VNP23، 5 سنوات من الجرعة السابقة.</p> <p>من 2 إلى 5 سنوات الغير الملقحين:</p> <p>جرعتان من VNC13 (في فترة 8 أسابيع) + NPV23 (بين 8 أسابيع و 12 شهرًا). جرعة معززة من VNP23، 5 سنوات من الجرعة السابقة.</p> <p>فوق خمس سنوات لغير الملقحين:</p> <p>جرعة واحدة من VNC13+VNP23 فترة (12 شهرًا، حد أدنى 8 أسابيع). جرعة معززة من VNP23، 5 سنوات من الجرعة السابقة.</p>	<p>النمط المتسلسل:</p> <p>4 جرعات: في عمر 0، 2، 4 و 11 شهرًا+</p> <p>جرعة واحدة: إبتداء من 24 شهرًا+</p> <p>جرعة واحدة (تذكير): بعد 5 سنوات من الجرعة السابقة</p>	<p>المكورات الرئوية</p> <ul style="list-style-type: none"> VNC13 VNP23
<p>لقاح غير مفعّل يعطى بعد 6 أشهر.</p>	<p>جرعة واحدة: كل سنة</p> <p>جرعتان: بالنسبة للأطفال دون سن 9 سنوات الذين تم تلقيحهم لأول مرة (الحد الأدنى لفترة أقل من 4 أسابيع)</p>	<p>أنفلونزا</p>
<p>تعطى إبتداء من سن 12 شهرًا</p>	<p>جرعتان: في فترة 6 أشهر (0 و 6 أشهر)</p>	<p>التهاب الكبد أ (VHA)</p>
<p>تلخح للبنات والأولاد</p>	<p>3 جرعات: في فترة 6 أشهر (0، 1-2 و 6 أشهر)</p>	<p>فيروس الورم الحليمي البشري (VPH)</p>

التعليقات والتحذيرات	جرعات	لقاح
<ul style="list-style-type: none"> • بالنسبة للأطفال دون سن 12 شهرًا، سيتم إعطائهم لقاح في جدول زمني بثلاث جرعات • بالنسبة للأطفال فوق 12 شهرًا، سيتم إعطاء جرعة أولية وجرعة معززة عند سن الثانية عشرة سنة. • سيتم تقييم الحاجة إلى جرعات تعزيزية لاحقًا 	<p>3 جرعات: في عمر 2 ، 4 و 11 شهرًا</p> <p>جرعتان : جرعة أولية + جرعة معززة</p>	<p>المكورات السحائية MenACWY لقاح ضد المكورات السحائية المرافقة ضد المجموعات المصلية A و C و W و Y</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يعطى اللقاح ابتداءً من عمر 12 شهر • موانع إستعماله، إذا كان عدد خلايا CD4 أقل من 200 خلية / مم مكعب أو كانت نسبة CD4 أقل من 15% • لا يجوز إستخدام لقاح الفيروس الرباعي 	<p>جرعتان : حد أدنى 4 أسابيع</p>	<p>تطعيم ثلاثي فيروس (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يعطى اللقاح ابتداءً من عمر 12 شهر. • موانع إستعماله، إذا كان عدد خلايا CD4 أقل من 200 خلية / مم مكعب أو كانت نسبة CD4 أقل من 15% • لا يجوز إستخدام لقاح الفيروس الرباعي 	<p>جرعتان: بفاصل زمني لا يقل عن 3 أشهر</p>	<p>الجدري</p>

ملاحظة: تم إعداد محتوى هذا الملف في سبتمبر 2021، لذلك قد تكون التوصيات أو المعلومات غير حديثة. لا يُقصد من المعلومات أن تحل محل تلك التي حصل عليها أخصائي الرعاية الصحية. يجب دائمًا اتخاذ القرارات الصحية بالتشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية.



¿TIENES DUDAS

SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org