


## RECOMMANDATIONS DE VACCINATION POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS VIVANT AVEC LE VIH



Les vaccins chez les enfants vivant avec le VIH sont bien tolérés et fournissent une protection qui est néanmoins moins durable et inférieure à celle qu'ils fournissent chez la population générale. Le taux de CD4 est considéré comme étant le meilleur indicateur de réponse aux vaccins. Dans le cas où l'enfant présenterait une immunodéficience, il est recommandé de commencer ou de redéfinir le traitement antirétroviral afin de rétablir l'immunité avant la vaccination et ainsi améliorer la réponse. Cette fiche contient des informations et des indications qui peuvent être utiles pour les parents ou les proches aidants d'enfants et d'adolescents vivant avec le VIH.

### RECOMMANDATIONS SUR LES VACCINS CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS VIVANT AVEC LE VIH

Vaccin	Dose	Commentaires et mises en garde
<b>Diphtérie, tétanos et coqueluche</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>DTPa-IPV</li> <li>dTpa</li> </ul>	<b>3 doses :</b> à l'âge de 2, 4 et 11 mois  <b>4 doses :</b> à l'âge de 2, 4, 6 et 18 mois	<b>Prénatal (dTpa) :</b> une dose de dTpa lors de chaque grossesse à partir de la 27 <sup>ème</sup> semaine de gestation, bien que de préférence durant la 27 <sup>ème</sup> ou la 28 <sup>ème</sup> semaine  <b>Vaccination systématique à 6 ans :</b> il sera administré un vaccin combiné DTPa-IPV aux mineurs qui ont reçu 3 doses du vaccin à l'âge de 6 ans. Ceux vaccinés avec 4 doses au total recevront une dose de dTpa
<b>Poliomyélite</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>VPI</li> </ul>	<b>3 doses :</b> à l'âge de 2, 4 et 11 mois  <b>4 doses :</b> à l'âge de 2,4, 6 et 18 mois	<b>Vaccination systématique à 6 ans :</b> il sera administré un vaccin combiné DTPa/MPI aux mineurs qui ont reçu 3 doses du vaccin à l'âge de 6 ans. Les vaccinés avec 4 doses au total recevront une dose de dTpa
<b>HiB (Haemophilus influenzae de type b)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>PRP-T</li> <li>DTPa-IPV-VH-B+HiB</li> </ul>	<b>3 doses :</b> à l'âge de 2, 4 et 11 mois	<b>Vaccination pendant l'enfance :</b> il sera administré trois doses de DTPa-VPI-VHB+HiB  <b>Vaccination chez les adolescents et les jeunes :</b> chez les personnes non vaccinées préalablement, jusqu'à l'âge de 18 ans, il sera administré une dose unique

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENCIA SDG  
GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD / SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA Y EMPLEO / DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA / SECRETARÍA DEL BIENestar SOCIAL SOBRE EL SIDA

✓ POR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya / Salut / Agència de Salut Pública de Catalunya

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALLS SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

Vall d'Hebron / eSPiC / Equip de salut pública i comunitària



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org

Vaccin	Dose	Commentaires et mises en garde
<b>Hépatite B (VHB)</b>	<p><b>3 doses :</b> à l'âge de 2, 4 et 11 mois</p> <p><b>4 doses :</b> à l'âge de 0, 2, 4 et 11 mois</p>	<p><b>Vaccination pendant l'enfance :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le vaccin sera administré avec un schéma à 3 doses si le dépistage prénatal de la mère enceinte a été réalisé</li> <li>• Les enfants de mères avec AgHBs positif seront vaccinés avec un schéma à quatre doses. La première dose sera administrée durant les premières 24 heures de vie en même temps que l'administration d'immunoglobuline anti-HBs</li> <li>• Si passées 4-8 semaines le niveau d'anticorps est trop bas, la possibilité de revacciner sera valorisée (3 doses en 6 mois) avec un vaccin pour adultes</li> </ul> <p><b>Vaccination chez les adolescents et les jeunes :</b> il sera administré 3 doses (à 0, 1 et 6 mois) aux personnes non vaccinées préalablement, jusqu'à 18 ans</p>
<p><b>Pneumocoque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VNC13</li> <li>• VNP23</li> </ul>	<p><b>Schéma séquentiel :</b></p> <p><b>4 doses :</b> à l'âge de 0, 2, 4 et 11 mois +</p> <p><b>1 dose :</b> à partir de l'âge de 24 mois +</p> <p><b>1 dose (rappel):</b> 5 ans après la dernière dose</p>	<p><b>Moins de 2 ans :</b> VNC13 (2, 4, 6 et 11 mois) + VNP23 (à partir de 24 mois). Dose de rappel de VNP23, 5 ans à compter depuis la dose précédente</p> <p><b>De 2 à 5 ans non vaccinés :</b> 2 doses de VNC13 (avec 8 semaines d'intervalle) + VNP23 (entre 8 semaines y 12 mois après). Dose de rappel de VNP23, 5 ans à compter depuis la dose précédente</p> <p><b>&gt;5 ans non vaccinés :</b> 1 dose de VNC13 + VNP23 (intervalle de 12 mois, minimum 8 semaines). Dose de rappel de VNP23, 5 ans à compter depuis la dose précédente</p>
<b>Gripe</b>	<p><b>1 dose :</b> chaque année</p> <p><b>2 doses :</b> chez les moins de 9 ans vaccinés pour la première fois (intervalle minimum de 4 semaines)</p>	Vaccin inactivé administré à partir de 6 mois
<b>Hépatite A (VHA)</b>	<b>2 doses :</b> sur une période de 6 mois (0 et 6 mois)	Administré à partir de l'âge de 12 mois
<b>Papillomavirus (HPV)</b>	<b>3 doses :</b> sur une période de 6 mois (0, 1-2 et 6 mois)	Administré aux enfants

Vacuna	Dosis	Comentarios
<b>Meningococo</b>  <b>MenACWY :</b> vaccin méningococcique conjugué contre les sérogroupes A, C, W et Y	<b>3 doses :</b> à l'âge de 2, 4 et 11 mois  <b>2 doses :</b> dose initiale + dose de rappel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sera administré aux moins de 12 mois le vaccin selon un schéma de trois doses</li> <li>• Il sera administré aux enfants de plus de 12 mois une dose initiale ainsi qu'une dose de rappel à 12 ans</li> <li>• L'utilité de doses de rappel ultérieures sera évaluée</li> </ul>
<b>Vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole)</b>	<b>2 doses :</b> avec un intervalle d'au minimum 4 semaines	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccin administré à partir de l'âge de 12 mois</li> <li>• Contre-indiqué si le taux de CD4 est inférieur à 200 cellules/mm<sup>3</sup> ou si le pourcentage de CD4 est inférieur à 15%</li> <li>• Il est exclu d'utiliser un vaccin RORV</li> </ul>
<b>Varicela</b>	<b>2 doses :</b> avec un intervalle d'au minimum 3 mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccin administré à partir de l'âge de 12 mois</li> <li>• Contre-indiqué si le taux de CD4 est inférieur à 200 cellules/mm<sup>3</sup> ou si le pourcentage de CD4 est inférieur à 15%</li> <li>• Il est exclu d'utiliser un vaccin RORV</li> </ul>

**Note :** Le contenu de cette fiche ayant été élaboré en septembre 2021, les recommandations pourraient ne pas être actualisées. L'information ne prétend pas remplacer celle reçue par un professionnel de santé. Les décisions concernant la santé devraient être prises après avoir consulté les professionnels de santé.

**Sources :** Groupe de travail sur la vaccination de la population adulte et des groupes à risque du Programme et du Registre des Vaccinations. Vaccination dans les groupes à risque de tous âges et dans des situations spécifiques. Commission de Santé publique du Conseil interterritorial du Système national de Santé Espagnol. Ministère de la Santé, de la Consommation et de la Protection sociale Espagnol, juillet 2018.

Groupe de Travail technique sur la vaccination COVID-19, du Programme et du Registre des Vaccinations. Stratégie de vaccination contre la COVID19 en Espagne. Mise à jour 9 modifiée. 2 novembre 2021.



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org