


## Recomandări de vaccinare pentru persoanele cu HIV

Persoanele cu HIV pot fi mai susceptibile la anumite infecții, mai ales dacă sistemul lor imunitar este mai slăbit. Din acest motiv, li se recomandă vaccinarea cu majoritatea vaccinurilor incluse în calendarul de vaccinare. Există anumite recomandări și avertismente adresate în mod specific persoanelor cu HIV cu privire la unele vaccinuri. Această fișă conține informații și îndrumări pe care le puteți găsi utile pentru a discuta această problemă cu echipa medicală care vă tratează.



Vaccinul	Doza	Comentarii
<p><b>Pneumococ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PCV13:</b> vaccin antipneumococic conjugat împotriva a 13 tipuri de bacterii</li> <li>• <b>PPV23:</b> vaccin pneumococic ne-conjugat împotriva a 23 de tipuri de bacterii</li> </ul>	2 doze în 8 săptămâni	<p><b>Adulți nevaccinați:</b> 1 doză de PCV13 și apoi o altă doză (cel puțin 8 săptămâni mai târziu) de PPV23.</p> <p><b>Adulți vaccinați cu PPV23:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 doză de PCV13 la cel puțin 1 an de la ultima doză de PPV23; sau</li> <li>• 1 doză de PPV23 în fiecare an timp de 5 ani.</li> </ul>
<p><b>Gripa</b></p>	1 doză anuală	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomandă administrarea lui în fiecare an.</li> <li>• Trebuie utilizat vaccin inactivat nereplicativ.</li> </ul>

Vaccinul	Doza	Comentarii
<b>Hepatita B (VHB)</b>	3 sau 4 doze în 6 luni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomandă administrarea a trei injecții în doze elevate (0, 1 și 6 luni) sau,</li> <li>• Administrați patru injecții cu doze scăzute (0, 1, 2 și 6 luni).</li> <li>• Verificați nivelurile de anticorpi și, dacă sunt insuficiente, administrați trei noi injecții cu doze elevate pe lună sau revaccinare cu același program.</li> </ul>
<b>Hepatita A (VHA)</b>	2 sau 3 doze într-o perioadă de 6 luni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomandă un regim cu două doze (0,6 luni) la persoanele cu un număr de CD4 peste 350 celule/mm<sup>3</sup>.</li> <li>• Se recomandă un regim de trei doze (0, 1 și 6 luni) la persoanele cu un număr de CD4 sub 350 celule/mm<sup>3</sup>.</li> </ul>
<b>Virusul papilomei umane (HPV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vaccin bivalent HPV:</b> Protecție împotriva a 2 tipuri de HPV</li> <li>• <b>Vaccin cvadivalent</b> Protecție împotriva a 4 tipuri de HPV</li> <li>• <b>Vaccin nonavalent</b> Protecție împotriva a 9 tipuri de HPV</li> </ul>	3 doze într-o perioadă de 6 luni (0, 1-2 și 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccinul este recomandat persoanelor cu HIV până la 26 de ani sau 45 de ani în funcție de comunitatea autonomă.</li> <li>• Se recomandă vaccinul nonavalent.</li> <li>• A se vedea fișa numărul 147.</li> </ul>
<b>Meningococul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MenC:</b> Vaccin meningococic conjugat împotriva serogrupului C</li> <li>• <b>MenACWY:</b> Vaccin meningococic conjugat împotriva serogrupurilor A, C, W și Y (MenACWY)</li> </ul>	2 doze (0, 2 luni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomandă vaccinul MenACWY.</li> <li>• Se va valora o nouă doză la 5 ani.</li> </ul>
<b>Tetanos</b>	5 doze. Se vor lua în considerare doze suplimentare la fiecare 10 ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă persoana este vaccinată corect (5 doze), dozele de renovare pot fi evaluate la fiecare 10 ani în cazurile de expunere la riscuri.</li> </ul>
<b>SARS-CoV-2 (COVID-19)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccin ARNm (Comirnaty®; Pfizer)</li> <li>• Vaccin ARNm (Spikevax®; Modern)</li> <li>• Vaccin cu vectori adenovirus (Vaccinul COVID-19 Janssen)</li> </ul>	2 doze (0-21 zile sau 0-28 zile) sau 1 doză. Dozele suplimentare sau de rapel vor fi luate în considerare în anumite circumstanțe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccinurile ARNm sunt recomandate persoanelor cu HIV cu un sistem imunitar slăbit (&lt;200 celule/mm<sup>3</sup>).</li> <li>• Pentru persoanele cu un număr de CD4 sub 200 celule/mm<sup>3</sup>, se recomandă o doză suplimentară de vaccin administrată la cel puțin 28 de zile după a doua doză a programului de vaccinare.</li> <li>• A se vedea fișa numărul 168.</li> </ul>

Vaccinul	Doza	Comentarii
<b>Triplu viral</b>	2 doze (0,1 lună)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomandat pentru pacienții seronegativi la sarampion dacă numărul lor de CD4 este peste 200 celule/mm<sup>3</sup> timp de cel puțin 6 luni.</li> <li>• Femei seronegative pentru rubeolă dacă numărul lor de CD4 este peste 200 celule/mm<sup>3</sup> timp de cel puțin 6 luni.</li> <li>• Contraindicat în persoane cu imunodepresie gravă.</li> </ul>
<b>Varicela</b>	• 2 doze (0 și 3 luni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomandă pacienților care sunt seronegativi la varicela dacă numărul lor de CD4 este peste 200 celule/mm<sup>3</sup>.</li> <li>• Nu utilizați vaccinul tetraviral.</li> <li>• Contraindicat în persoane cu imunodepresie gravă.</li> </ul>
<b>Herpes zoster</b> (Vaccin cu adjuvant recombinant)	2 doze (0, 2 luni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccinul este indicat pentru persoanele cu HIV majore de 18 ani.</li> <li>• Acești pacienți trebuie să aibă infecția controlată datorită tratamentului antiretroviral pe o perioadă, minimă de un an.</li> </ul>
<b>Variolă de maimuță</b>	2 doze (0,1 lună)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persoanele cu HIV care nu au trecut boala cu anterioritate și, care mențin relații sexuale cu un risc mare au prioritate în a fi vaccinate și,</li> <li>• În persoanele cu HIV care au menținut un contact foarte apropiat cu un caz confirmat.</li> </ul>

**Notă:** Conținutul acestei fișe a fost elaborat în septembrie 2022, deci este posibil ca recomandările să nu fie la zi. Informațiile nu sunt destinate să le înlocuiască pe cele primite de un profesionist din domeniul sănătății. Deciziile asupra sănătății ar trebui să fie întotdeauna luate în consultare cu profesioniștii din domeniul sănătății.


**Sursa:**

Grupul de lucru Vaccinări în populația adultă și grupurile de risc din Registrul de Vaccinări și Raportul Programului. Vaccinarea în grupurile de risc de toate vârstele și în anumite situații. Comisia de Sănătate Publică a Consiliului Interteritorial al Sistemului Național de Sănătate. Ministerul Sănătății, Consumului și Asistenței Sociale, iulie 2018.

Grupul de lucru tehnic Vaccinarea împotriva COVID-19, Programul de vaccinare și Raportul de registru. Strategia de vaccinare împotriva COVID19 în Spania. Actualizarea 11 a fost modificată. 8 februarie 2022.

Recomandări de vaccinare pentru monkeypox de la Prezentarea Programului și Registrului de Vaccinări. Comisia de Sănătate Publică a Consiliului Interteritorial al Sistemului Național de Sănătate. Ministerul de Sănătate, august 2022.

Grupul de muncă pentru vacunarea împotriva herpesului Zoster de la Prezentarea Programului și Registrului de Vaccinări. Comisia de Sănătate Publică a Consiliului Interteritorial al Sistemului Național de Sănătate. Ministerul de Sănătate, mai 2021.



**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41

**Descărcarea responsabilității**

Informațiile cuprinse în această fișă nu sunt menite să le înlocuiască pe cele primite de către un medic. Deciziile privind sănătatea ar trebui să fie întotdeauna luate în consultare cu profesioniștii din domeniul sănătății. Informațiile medicale pot deveni rapid desactualizate.

Dacă aveți întrebări după ce ați citit această fișă, vă sfătuim să consultați cu medicul dumneavoastră ori cu asistenta sau să sunați la gTt-VIH, la telefonul 93 458 26 41, pentru a verifica dacă există vreo noutate relevantă în acest sens.

[www.gtt-vih.org](http://www.gtt-vih.org)

SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE  
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.

**SUBVENCIONA**

✓ POR SOLIDARIDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat  
de Catalunya

Salut/ Agència de Salut  
Pública de Catalunya

Diputació  
Barcelona

Àrea d'Iguatallat  
i Sostenibilitat Social

Ajuntament de Barcelona

**COLABORA**

Vall d'Hebron  
Equip de salut  
pública i comunitària