



Hépatite B et VIH


L'hépatite B est une inflammation du foie provoquée par le virus appelé hépatite B (VHB). Ce virus partage plusieurs des voies de transmission du VIH, raison pour laquelle un pourcentage important de personnes avec le VIH sont également coinfectées par le VHB. Le VIH provoque que l'hépatite B progresse plus rapidement, mais il n'y a pas de preuves que l'hépatite B affecte l'évolution de l'infection due au VIH.

Transmission

L'hépatite B ne peut pas se contracter à travers des activités de la vie quotidienne, elle se propage à travers le contact avec du sang, du sperme ou des fluides vaginaux d'une personne qui a ce virus. Parfois, les personnes peuvent éliminer le VHB de l'organisme de façon spontanée. Si ce n'est pas le cas, l'infection devient chronique. Sans le traitement et les soins adéquats, avec le temps l'hépatite B peut provoquer des dommages importants au foie et à la santé des personnes.

Les personnes avec le VIH ont moins de possibilités de dissiper le virus de façon spontanée et, de plus, elles peuvent expérimenter une progression plus rapide de la maladie hépatique. Pour cette raison, il est important que toutes les personnes avec le VIH fassent le test de dépistage du VHB.

De plus, toutes les personnes avec le VIH coinfectées par le VHB devraient se vacciner contre l'hépatite B (voir InfoVIHtal : Recommandations de vaccination pour les personnes avec le VIH).



Prévention

La meilleure manière de prévenir l'infection due à l'hépatite B est le vaccin. Si vous avez déjà le VHB, il est recommandé que votre partenaire sentimental(e) se vaccine également contre ce virus.

D'autres mesures pour réduire le risque d'infection due au VHB sont :

- Utilisation de préservatifs
- · Ne pas partager de matériel d'injection de drogues
- Ne pas partager d'objets personnels qui puissent contenir du sang (rasoirs, brosses à dents, etc.)
- S'assurer que les matériaux de tatouage ou de piercing soient stérilisés

Traitement

L'hépatite B peut se traiter avec des médicaments spécifiques qui aident à réduire la charge virale du VHB et à minimiser les dommages au foie. Les personnes coinfectées par le VIH/VHB doivent recevoir du traitement pour les deux maladies. Cependant, la sélection de ces médicaments dépend de chaque personne. Dans certains cas, on peut prendre des antirétroviraux qui ont également un effet contre le VHB, alors que dans d'autres cas il sera nécessaire de prendre un antiviral contre le VHB en plus du traitement habituel contre le VIH.





Hépatite B et VIH

Important:

Même si l'hépatite B peut s'éliminer de façon spontanée, une fois qu'elle devient chronique elle n'a pas de remède. Un nombre important de personnes avec le VIH ont l'hépatite B, c'est pour cela qu'il faut vérifier si les personnes avec le VIH sont coinfectées.

Il est recommandé que toutes les personnes avec le VIH se vaccinent contre l'hépatite B. Il est important que les personnes avec le VIH s'occupent (et traitent si besoin) de l'hépatite B.



Source: NIH



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS Tel. 93 458 26 41

Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta ficha no pretende sustituir la recibida por el médico. Las decisiones referentes a la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios. La información médica puede quedar desactualizada con rapidez.

Si te surge alguna pregunta tras leer esta ficha, te aconsejamos hablar con tu médico o enfermera o llamar a gTt-VIH, al 93 458 26 41, para comprobar si existe alguna novedad relevante al respecto.

SUBVENCIONA
















COLABORA





www.gtt-vih.org

