

Hepatite B e VIH


A hepatite B é uma inflamação do fígado provocada pelo denominado vírus da hepatite B (VHB). Este vírus compartilha várias das vias de transmissão do VIH, por isso um elevado número de pessoas com o VIH também se encontra infetada pelo VHB. O VIH faz com que a hepatite B progrida com maior rapidez, mas não há provas de que a hepatite B afete o desenvolvimento da infeção pelo VIH.

Transmissão

A hepatite B não se pode adquirir nas atividades da vida quotidiana, mas é transmitida através do contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais de uma pessoa que tem o vírus. Às vezes as pessoas podem eliminar o VHB do organismo de forma espontânea. Se não acontecer isso, a infeção torna-se crónica. Sem o tratamento e os cuidados adequados, com o tempo a hepatite B pode causar danos sérios ao fígado e à saúde das pessoas.

As pessoas com o VIH têm menos possibilidades de eliminar o vírus espontaneamente e, além disso, podem experimentar um avanço mais rápido da doença hepática. **Por esta razão é importante que todas as pessoas com o VIH façam a prova de deteção do VHB.**

Além disso, todas as pessoas com o VIH não infetadas com o VHB devem vacinar-se contra a hepatite B (consultar InfoVHtal: Recomendações de vacinação para pessoas com o VIH).



Prevenção

A melhor maneira de prevenir a infeção pela hepatite B é a vacina. Se já tiveres o VHB, é aconselhável que a/o tua/teu companheira/o também se vacine contra este vírus.

Outras medidas para reduzir o risco de infeção pelo VHB são:

- Uso de preservativos
- Não partilhar material de injeção de drogas
- Não partilhar objetos pessoais que possam conter sangue (lâminas, escovas de dentes, etc.)
- Assegurar-se de que os materiais de tatuagens ou piercings estejam esterilizados.

Tratamento

A hepatite B pode-se tratar com determinados fármacos que ajudam a reduzir a carga viral do VHB e minimizam o dano ao fígado. **As pessoas infetadas por ambos VIH/VHB devem reduzir o tratamento de ambas doenças.** Contudo, a seleção de estes fármacos depende de cada pessoa. Nalguns casos, podem tomar antirretrovirais que também fazem efeito contra o VHB; noutros casos deve-se tomar um antiviral contra o VHB, além do tratamento habitual contra o VIH.


Em destaque:

Ainda que a hepatite B se possa eliminar de forma espontânea, quando passa a crónica já não tem cura.

Um número significativo de pessoas com o VIH tem hepatite B, razão pela qual se deve comprovar se as pessoas com o VIH estão também infetadas pelo VHB.

É aconselhável que todas as pessoas com o VIH se vacinem contra a hepatite B.

É importante que as pessoas com o VIH tenham presente (e tratem caso seja necessário) a hepatite B.



Fonte: NIH

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41

Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta ficha no pretende sustituir la recibida por el médico. Las decisiones referentes a la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios. La información médica puede quedar desactualizada con rapidez.

Si te surge alguna pregunta tras leer esta ficha, te aconsejamos hablar con tu médico o enfermera o llamar a gTt-VIH, al 93 458 26 41, para comprobar si existe alguna novedad relevante al respecto.

SUBVENCIONA



POB SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE CONTROL DE FARMACOS, PRODUCTOS Y TUBERCULOSIS

Generalitat de Catalunya

Salut / Agència de Salut Pública de Catalunya



Diputació de Barcelona

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social



Ajuntament de Barcelona

COLABORA



ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT



eSPiC
Equip de salut pública i comunitària

www.gtt-vih.org

SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.