

Hepatita B și HIV

Hepatita B este o inflamație a ficatului cauzată de așa numitul virus al hepatitei B (VHB). Acest virus împarte mai multe dintre căile de transmitere HIV, astfel încât un procent semnificativ de persoane cu HIV sunt, de asemenea, coinfectate cu VHB. HIV face ca hepatita B să progreseze mai rapid, dar nu există dovezi că hepatita B afectează cursul infecției HIV.


Transmiterea

Hepatita B nu poate fi dobândită prin activitățile vieții de zi cu zi, ci se răspândește prin contactul cu sângele, lichidul seminal sau lichidele vaginale de la o persoană care are virusul. Uneori oamenii pot elimina singuri VHB din organism. Dacă nu, infecția devine cronică. Fără tratamentul și îngrijirea adecvată, cu timpul, hepatita B poate provoca daune semnificative ficatului și sănătății persoanelor.

Persoanele cu HIV sunt mai puțin susceptibile de a curăța virusul în mod spontan și pot experimenta, de asemenea, o progresie mai rapidă a bolii hepatice.

De aceea este important ca toate persoanele cu HIV să fie testate pentru VHB.

În plus, toate persoanele cu HIV care sunt coinfectate cu VHB ar trebui să fie vaccinate împotriva hepatitei B (vezi InfoVHtal: Recomandări de vaccinare pentru persoanele cu HIV).



Prevenirea

Cel mai bun mod de a preveni infecția cu hepatita B este vaccinul. Dacă aveți deja VHB, este recomandabil ca și partenerul dumneavoastră să se vaccineze împotriva acestui virus.

Alte măsuri pentru reducerea riscului de infecție cu VHB sunt:

- Utilizarea prezervativelor
- Nu împărtășiți echipamentul pentru medicamente/ droguri injectabile
- Nu împărtășiți obiecte personale care pot conține sânge (mașini de ras, periute de dinți etc.)
- Asigurați-vă că materialele pentru tatuaje sau piercing sunt sterilizate.

Tratamentul

Hepatita B poate fi tratată cu anumite medicamente care ajută la reducerea încărcăturii virale HBV și la minimizarea leziunelor hepatice. **Persoanele coinfectate cu HIV/VHB ar trebui să primească tratament pentru ambele boli.** Cu toate acestea, selecția acestor medicamente depinde de fiecare persoană. În unele cazuri, aceștia pot lua antiretrovirale care funcționează și împotriva VHB, în timp ce în altele, va trebui să ia un antiviral VHB în plus față de tratamentul lor obișnuit împotriva HIV.

A evidența

Deși hepatita B poate fi eliminată spontan, odată ce devine cronică nu există nici un tratament.

Un număr semnificativ de persoane cu HIV au hepatită B, așa că trebuie verificat dacă persoanele cu HIV sunt co-infectate.

Se recomandă ca toate persoanele cu HIV să se vaccineze împotriva hepatitei B.

Este important ca persoanele cu HIV să se îngrijească (și să trateze dacă este necesar) hepatita B.



Sursă: NIH

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41

Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta ficha no pretende sustituir la recibida por el médico. Las decisiones referentes a la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios. La información médica puede quedar desactualizada con rapidez.

Si te surge alguna pregunta tras leer esta ficha, te aconsejamos hablar con tu médico o enfermera o llamar a gTt-VIH, al 93 458 26 41, para comprobar si existe alguna novedad relevante al respecto.

SUBVENCIONA



POB SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Generalitat de Catalunya

Salut / Agència de Salut Pública de Catalunya



Diputació de Barcelona

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social



Ajuntament de Barcelona

COLABORA



ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE
IMMIGRACIÓ I SALUT



Vall d'Hebron
Hospital Universitari de Barcelona

eSPiC
Equip de salut pública i comunitària

www.gtt-vih.org

SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.