


إلتهاب الكبد B وفيروس VIH



إلتهاب الكبد B هو إلتهاب في الكبد يسببه ما يسمى بفيروس إلتهاب الكبد VHB (B) يشترك هذا الفيروس في العديد من طرق إنتقال فيروس VIH، لذا فإن نسبة كبيرة من المصابين بفيروس VIH مصابون أيضاً بفيروس إلتهاب الكبد VHB. يتسبب فيروس VIH في تقدم إلتهاب الكبد B بسرعة أكبر ، ولكن لا يوجد دليل على أن إلتهاب الكبد B يؤثر على مسار الإصابة بفيروس VIH

إنتقال

لا يمكن الإصابة بإلتهاب الكبد B من خلال أنشطة الحياة اليومية ، ولكنه ينتشر أو ينقل من خلال ملامسة الدم أو السائل المنوي أو السوائل المهبلية من شخص مصاب بالفيروس. في بعض الأحيان يمكن للناس التخلص من إلتهاب الكبد B من الجسم بمفردهم. إذا لم يكن الأمر كذلك ، تصبح العدوى مزمنة. بدون العلاج والرعاية المناسبين ، يمكن أن يسبب إلتهاب الكبد B ضرراً كبيراً للكبد وصحة الناس بمرور الوقت.

الأشخاص المصابون بفيروس VIH هم أقل عرضة للتخلص من الفيروس تلقائياً وقد يعانون أيضاً من تطور سريع لأمراض الكبد. لهذا فمن الضروري القيام باختبار لجميع المصابين بفيروس VIH من أجل الكشف عن VHB.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب تطعيم أو تلقيح جميع الأشخاص المصابين بفيروس VIH والغير المصابين بفيروس إلتهاب الكبد B ضد إلتهاب الكبد من نوع (B) انظر InfoVIHtal: توصيات التلقيح للأشخاص المصابين بفيروس VIH.

وقاية

أفضل طريقة للوقاية من عدوى إلتهاب الكبد B هو اللقاح. إذا كنت مصاباً بفيروس إلتهاب الكبد VHB ، فمن المستحسن أن يتم تلقيح شريكك أيضاً ضد هذا الفيروس.

التدابير الأخرى لتقليل من خطر الإصابة بفيروس VIH هي:

- استخدام الأغشية الواقية
- لا تشارك أو تتقاسم معدات حقن المخدرات
- لا تشارك أو تتقاسم الأغراض الشخصية التي قد تحتوي على دم (شفرات الحلاقة، فرش الأسنان ، إلخ.)
- تأكد من أن تكون أدوات الوشم أو أدوات التقب معقمة.

علاج

يمكن علاج إلتهاب الكبد B بأدوية معينة تساعد في تقليل الحمل الفيروسي VHB وتقليل من تلف الكبد. يجب أن يتلقى الأشخاص المصابون بفيروس VIH وإلتهاب الكبد VHB العلاج لكلا المرضين. ومع ذلك ، فإن إختيار هذه الأدوية يعتمد على كل شخص. في بعض الحالات ، يمكنهم تناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي تعمل أيضاً ضد فيروس إلتهاب الكبد B ، بينما في حالات أخرى ، يجب تناول مضادات فيروسات ضد VHB بالإضافة إلى علاجهم المعتاد لفيروس VIH

للجدير بالذكر:

يعاني عدد كبير من الأشخاص المصابين بفيروس VIH من إلتهاب الكبد B ، لذلك يجب التحقق مما إذا كان الأشخاص المصابون بفيروس VIH مصابين بالعدوى

على الرغم من أنه يمكن التخلص من إلتهاب الكبد B بطريقة تلقائية، إلا أنه بمجرد أن يصبح مزمنًا لا يوجد له علاج.

من المهم أن يهتمون المصابون بفيروس VIH (ويعالجون إذا لزم الأمر) بإلتهاب الكبد B

يُنصح بتطعيم أو تلقيح جميع المصابين بفيروس VIH ضد إلتهاب الكبد B



مصدر: NIH

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41

Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta ficha no pretende sustituir la recibida por el médico. Las decisiones referentes a la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios. La información médica puede quedar desactualizada con rapidez.

Si te surge alguna pregunta tras leer esta ficha, te aconsejamos hablar con tu médico o enfermera o llamar a gTt-VIH, al 93 458 26 41, para comprobar si existe alguna novedad relevante al respecto.

SUBVENCIONA



✓ POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE CONTROL DE FARMACOS, PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y TUBERCULOSES

Generalitat de Catalunya

Salut/ Agència de Salut Pública de Catalunya



Diputació de Barcelona | Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social



COLABORA



www.gtt-vih.org

SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO