

Où nous trouver ?

Nous sommes là pour vous soutenir dans tout ce qui concerne le VIH, votre bien-être et votre qualité de vie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou d'informations.

Nous sommes là pour vous !

Attention sur rendez-vous :

C/ Gandía 1, local 9A (coworking Freeland)
Stations de métro les plus proches :
Pacífico (L1 y L6) et Puente de Vallecas (L1)

Contact pour information :

Tél. (+34) 683 28 03 12

e-mail: madrid@gtt-vih.org

Contact pour l'assistance juridique :

Tél. (+34) 659 11 02 07

e-mail: legal@gtt-vih.org

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :



@gTtVIH

@infodrogasvih



gtt.vih




gtt_vih

Projet:

VIH e interculturalidad. 2025

Subvencionado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (Orden 690/2025, de 22 de abril de 2025, de la Consejería de Sanidad).

SUBVENCIONADA 0,7% IRPF:



Comunidad de Madrid


gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

www.gtt-vih.org

Le contenu de ce matériel informatif relève de la responsabilité exclusive de l'organisme.
La Communauté de Madrid n'en est pas responsable.

12 Comment savoir si j'ai une IST ? Symptômes

FRANÇAIS



grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

Comment savoir si j'ai une IST ?

Symptômes

Une IST peut ne présenter aucun symptôme. Mais si vous remarquez quelque chose d'inhabituel dans votre corps, cela peut être un signe.

→ Symptômes au niveau du pénis ou du vagin :

- Écoulement ou sécrétion inhabituelle au niveau du pénis ou du vagin (couleur, odeur ou quantité différente).
- Douleur ou brûlure lors de la miction.
- Plaies ou petites blessures sur ou près du pénis, du vagin ou de l'anus. Qu'elles soient douloureuses ou non.
- Douleur pendant les rapports sexuels.
- Démangeaisons, irritation, rougeurs ou gêne dans la région génitale.

→ Autres symptômes :

- Douleur dans le bas-ventre.
- Douleur ou gonflement des testicules.
- Douleur dans la gorge si vous avez eu des rapports sexuels oraux.
- Démangeaisons ou saignements au niveau de l'anus si vous avez eu des rapports sexuels anaux.
- Taches ou éruptions cutanées sur le corps qui ne disparaissent pas.

Utiliser un préservatif lors de chaque rapport sexuel est le meilleur moyen de prévenir les IST. Examinez régulièrement vos parties génitales afin de détecter d'éventuels symptômes d'une IST et, le cas échéant, consultez un médecin dès que possible. Si vous avez une vie sexuelle active, il est recommandé de faire des examens réguliers.



Que faire si vous présentez l'un de ces symptômes ?

Si vous remarquez l'un de ces symptômes, ne paniquez pas.

1. Consultez votre médecin ou rendez-vous dans un centre de santé. La plupart des IST se soignent facilement si elles sont traitées à temps.

2. N'ayez pas de rapports sexuels tant que vous ne savez pas si vous avez une IST afin d'éviter de la transmettre à d'autres personnes.

3. Ne vous soignez pas vous-même. Seul votre professionnel de santé peut vous prescrire le traitement approprié.

4. Informez votre ou vos partenaires sexuels. Ils pourraient également être infectés et avoir besoin de soins médicaux et d'un traitement.